

Lansoprazole

【ITAK】Takepron® 30mg/Vial

ATC Code : A02BC03

中文名：泰克胃通靜脈注射劑 «Takeda»

適應症：無法投與口服藥物之胃潰瘍、十二指腸潰瘍與急性壓力性潰瘍病患。

藥理分類：Proton Pump Inhibitor

用法用量：**Administration:** IV Infusion over 30 mins.

Indications and Dosage regimen:

Duodenal ulcer, Gastric ulcer, Stress ulcer:

30 mg QD~BID.

不良反應：腹瀉、噁心、腹痛、便秘。

交互作用：

- Clopidogrel: ↓ antiplatelet activity.
- Gefitinib, capecitabine, erlotinib, Cellcept®: ↓ exposure of above drugs.
- Voriconazole: ↑ plasma concentrations of lansoprazole.
- Cilostazol: ↑ cilostazol exposure.
- Warfarin: ↑ in INR and potentiation of anticoagulation effects.

注意事項：1.本藥物治療的臨床經驗為 7 天，建議使用本藥不得超過 7 天。

2.須注意低血鎂。

3.只能以靜脈輸注方式投與，輸注管線不可與其他藥物共用；輸注管線於投與泰克胃通靜脈注射劑前後應以注射用生理食鹽水或 5%葡萄糖注射液沖洗。

注射劑調製與

相關注意事項：

1. 注入 5 mL NS 或 D5W 至小藥瓶內，輕輕地混合至粉末溶解。以 50 mL 的 NS 或 D5W 稀釋配製液，混合液配製完成後應立即使用。僅可使注射用生理食鹽水(NS)或 5%葡萄糖注射液稀釋(D5W)。
2. 靜脈輸注時間 30 分鐘以上。
3. 應使用專用的輸注管線，且此輸注管線不可與其他藥物共用。若不可避免的
使用投與其他藥物的輸注管線經 Y-site 投與泰克胃通®靜脈注射劑，則應先停止其他藥物的輸注，且輸注管線於投與泰克胃通®靜脈注射劑前後應以注射用生理食鹽水或 5%葡萄糖注射液沖洗。

懷 孕 期： 唯有預期療效利益大於任何可能風險時，才使用於孕婦或可能懷孕的婦女。

授 乳 期： 建議授乳母親應避免使用。但若患者必須接受本藥物治療，則應停止授乳。