

Varicella Virus Vaccine

【IVAR】Varilrix® (自費)

ATC Code : J07BK01

中文名： 美瑞克活性水痘疫苗 «GSK»

適應症： 水痘之主動免疫。

藥理分類： Vaccine, Live (Viral).

用法用量： **Administration:** SubQ: For SubQ injection only.

- Inject in the outer aspect of upper arm or the anterolateral thigh.
- Do not administer IV or IM.

Dosage regimens :

•13 歲以上的兒童 13 歲(含)以上：兩劑。

第二劑最好在第一劑施打至少 6 週後投予，無論如何，兩劑施打間隔均不可少於 4 週。

•12 個月至 12 歲大的兒童：

可接受 1-2 劑 Varilrix。如果需要接種兩劑，第二劑最好在第一劑施打至少 6 週後投予，無論如何，兩劑施打間隔不可小於 4 週。

•9 至未滿 12 個月大的嬰兒：

若在疾病流行期間，需要讓年齡不到 12 個月大的嬰兒施打疫苗，則第一劑 Varilrix 可在 9 個月大時即施打。第二劑 Varilrix 最好在接種第一劑之後 3 個月施打。 [注意：關於劑量間隔以及對於 9 個月至 12 歲間的兒童需使用一或兩劑水痘疫苗的實施正式建議可有所不同。]

不良反應： 呼吸道疾病、咳嗽、不安/神經緊張、疲倦、不易入睡、腹瀉、沒有食慾、嘔吐、耳炎、接觸性發疹、頭痛、抑鬱、腹痛、噁心、眼部不適、發冷、淋巴腺腫脹、肌痛、過敏反應、頸部僵硬、粟粒疹/灼熱、關節痛、溼疹/皮膚乾燥/皮膚炎、便秘、搔癢。

注意事項： 1. 本劑須皮下注射。不可直接注射於血管內。
2. 泡製後的疫苗必須立即使用。泡製後的疫苗在室溫下(25°C)最長可保存 90 分鐘，在冰箱中(2°C - 8°C)最長可保存 8 小時。
3. 因酒精及其他之殺菌劑會使得本疫苗變成無效，於注射前應等其由皮膚消散後再施打。
4. 接種水痘疫苗後 6 週內不應使用 salicylates 製劑，以免增加發生 Reye's syndrome 之危險性。

懷孕期： 1. 孕婦禁止接種 Varilrix。接種疫苗後的 1 個月內亦應避免懷孕。建議欲懷孕之女性應延後懷孕計畫。
2. 尚無充分的懷孕婦女使用 Varilrix 數據，且並未進行動物生殖毒性之試驗。

授乳期： 目前並無應用於授乳婦女方面的相關資料。。

儲存： 本劑須置於冰箱中 (2-8 °C) 避光儲存。