

RHZ3(Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide)

【O8053】 RHZ3® (Rifampin 75mg, Isoniazid 50mg, Pyrazinamide 150mg)/Tab ATC Code : J04AM05

中文名： 愛兒肺平-3，疾管專用兒童 RHZ-3(3 合一) «Macleods Pharmaceuticals »

適應症： 結核病

藥理分類： Antitubercular Agent.

用法用量： Administration: orally, taken on an empty stomach.

Dosage regimens:

Weight (kg)	No. of tablets
4-7	1
8-11	2
12-15	3
16-24	4
25+	Adult dosages recommended

不良反應： 腹瀉、噁心、頭暈、尿液變橘色、尿酸升高、肝指數異常、末梢神經病症。

交互作用： Rifamycin 會增加肝臟對皮質類固醇(corticosteroid)代謝酶的活性(此交互作用會在停用 rifampin 後 2~3 週才能回復正常)，臨牀上應盡量避免同時使用上述藥品，否則在 rifampin 維持 300/day 劑量下，corticosteroids 的劑量至少需增加一倍以上才能維持相同療效。

注意事項：

- 1.體液可能變成橘色，避免戴隱形眼鏡。
- 2.將所需藥錠投入飲水中，待其完全溶解後飲用。
- 3.若有皮膚過敏或皮膚變黃，應儘快告訴醫師。服藥期間會使淚液、尿液或糞便變成橘色。服藥期間不要配戴隱形眼鏡。
- 4.應於空腹(餐前至少 1 小時或餐後 2 小時)服用。

懷孕期：

1. 尚未針對孕婦做過良好的對照性研究，因此醫師對孕婦或可能懷孕者需加衡量利弊才可使用。
2. Due to the risk of tuberculosis to the fetus, treatment is recommended when the probability of maternal disease is moderate to high. Drug-susceptible TB guidelines recommend pyrazinamide as part of the initial treatment regimen; however, risks and benefits of use during pregnancy should be considered for each individual patient (Nahid 2016).

授乳期：

1. 已知 rifampicin 及 isoniazid 會進入母體乳汁。因此，哺乳的母親只有在對病人的潛在利益大於其對嬰兒的風險時才能使用。
2. Pyrazinamide is excreted in breast milk; In the treatment of drug-susceptible tuberculosis, use of pyrazinamide is not a contraindication to breastfeeding in women deemed non-infectious who are treated with first-line agents (ie, pyrazinamide) (Nahid 2016).

儲存： 於 25°C 以下乾燥處避光保存。