Terbinafine HCl

【OCAM】Camisan® 250mg/Tab *ATC Code：D01BA02*

中 文 名： 克黴先錠 250 公絲 «信東生技»

適 應 症： 甲癬(onychomyosis)、髮癬(tinea capitis)，嚴重且廣泛且經局部治療無效的皮膚黴菌感染。

藥理分類： **Antifungal Agent, Oral.**

用法用量： **Administration :** orally, taken without regard to meals.

Indications and dosage regimen :

Onychomyosis:

－**Fingernails:** 250 mg daily given for 6 weeks.

－**Toenails**: 250 mg daily given for 12 weeks.

Tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis & cutaneous candidiasis :

125 mg BID or 250 mg QD up to 6 weeks.

小孩：2 歲以下的小孩(通常小於 12 公斤)，沒有足夠資料顯示可以使用，不建議使用。

＜20 公斤：62.5 毫克一天一次。

20~40 公斤：125 毫克一天一次。

＞40 公斤：250 毫克一天一次。

治療時間(依感染型態，及嚴重度而定)：

- **皮膚感染：**

  足癬(趾間性、厚皮性)：2~6 星期。

  體癬、股癬：2~4 星期。

  皮膚念珠菌感染：2~4 星期

- **頭皮、毛髮的感染：**髮癬：4 星期

  髮癬主要發生於小孩身上，病人須注意如要避免感染再復發，其治療須照規定使用並服用適當長度時間。

- **灰指甲(甲癬)**：大部份的病人須使用 6~12 星期的治療程。

  手指甲甲癬：大部份須要 6 星期。

  腳指甲甲癬：大部份須要 12 星期。

不良反應： 胃腸不適、紅疹、味覺異常、肝指數上升。

交互作用：

- Warfarin：可能會增加出血的危險性，應密切監測 prothrombin time。
- Rifampicin：會提高本劑之血漿廓清率，因而降低本劑之治療反應。
- DOXOrubicin (Conventional): ↑ DOXOrubicin 血中濃度，避免併用。

注意事項： 1. 2 歲以下兒童、肝機能障礙患者及 Clcr 小於 20mL/min 者，不建議使用。

2.飯前或飯後服用均可。

3.於 15~30℃避光保存。

懷 孕 期： 懷孕者使用 Terbinafine 的臨床經驗很少，因此建議懷孕婦女不要使用，除非使用本品可能的好處大於可能的危險性。

授 乳 期： Terbinafine 可能出現在乳汁中，口服使用本品者不可授乳。