

24:32.92 Miscellane

Entresto Tab

【OENT】Entresto® 100mg film-coated tablets

ATC Code : C09DX04

中文名： 健安心 100 毫克膜衣錠 «NOVARTIS»

適應症： 治療慢性心臟衰竭

成分： Each tablet contains:

Sacubitril48.6 mg

Valsartan 51.4 mg

藥理分類： **Valsartan: Angiotensin II Receptor Blocker; Sacubitril: Neprilysin Inhibitor.**

用法用量： **Administration:** orally, administer with or without food.

Dosage regimen:

Heart failure:

Patients previously taking >10 mg/day of enalapril or >160 mg/day of valsartan or equivalent dose of another ACE inhibitor or ARB:

Initial: 1 tablet BID.

Double the dose as tolerated after 2 to 4 weeks to the target maintenance dose of 2 tabs BID.

Note: Concomitant use of an ACE inhibitor is **contraindicated**; allow a 36 hours washout period when switching from or to an ACE inhibitor.

不良反應： 低血壓、高血鉀、咳嗽、暈眩。

交互作用：

- Concomitant use of Entresto® with an ACE inhibitor is **contraindicated** because of the increased risk of angioedema.
- **Avoid** use of Entresto® with an ARB, because ENTRESTO contains the angiotensin II receptor blocker valsartan.
- The concomitant use of Entresto® with aliskiren is **contraindicated** in patients with **diabetes**. **Avoid** use with aliskiren in patients with renal impairment (eGFR <60 mL/min/1.73 m²).

- 注意事項：
1. 飯前或飯後服用均可。
 2. 坐或躺一段時間後，起身時應緩慢。
 3. 請儲存於原始包裝中。
 4. 孕婦使用前請先諮詢醫師。
 5. 本品禁止與 ACEI 併用。開始使用本藥，至少要和 ACEI 間隔 36 小時。
 6. 嚴重腎功能不佳者(CrCl < 30 mL/min)，建議自 50mg BID 開始。
 7. 中度肝功能不全 (Child-Pugh B 級)病人之建議起始劑量為 50mg BID。
不建議重度肝功能不全 (Child-Pugh C 級)病人使用。

懷 孕 期： 禁止使用。如果懷孕，請改用其他藥物，並停用 Entresto®。然而，如果除了作用於腎素 - 血管收縮素系統的藥物，沒有其他適當替代藥物，或當本藥可救治母親性命時，請告知懷孕女性本藥物對胎兒的潛在風險。

授 乳 期： 不建議使用。由於接受哺乳嬰兒暴露於 sacubitril/valsartan 可能發生嚴重不良反應，不建議在哺乳期間接受 Entresto®治療。