

Flunarizine

【OFLU5】 Flunazon<sup>®</sup> 5mg/Cap

ATC Code : N07CA03

中文名： 復腦通膠囊 《南光化學》

適應症： 噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

藥理分類： **Antiemetic; Calcium Channel Blocker.**

用法用量：

用法： 空腹或與食物一起服用皆可。

用量：

成人（18 歲及以上）

### 1. 偏頭痛之預防

開始劑量：

- 18 歲至 64 歲之成人病人每天 10 mg（睡前），
- 65 歲及以上之老年病人則每天 5 mg，
- 治療期間發生抑鬱、錐體外徑或其他無法接受之藥物不良反應時，需停止用藥。
- 若經過兩個月的治療未觀察到顯著改善，應視為無反應並需停用。

維持療法：

- 若病人對藥物反應良好且需要維持治療，應改變用藥時程，讓病人每星期有 5 天接受相同的每日劑量藥物治療，且連續停藥 2 天。
- 即使預防維持治療效果良好，且耐受性佳，6 個月後須停止用藥，且只在病人復發時，再重新開始給藥。

### 2. 眩暈

- 開始劑量與偏頭痛相同，治療期間至症狀控制為止，一般不會超過 2 個月。
- 然而慢性眩暈治療 1 個月或發作性眩暈治療 2 個月後，仍無明顯改善，該病人須被視為無反應並需停止用藥。
- 不要超過建議劑量。病人須固定時間間隔被檢視，如此方能及早發現錐體外徑或抑鬱症狀，且發生這些症狀時須中止治療。假如在持續治療期間療效減弱，也須中止治療。

### 3. 預防暈車、暈船：

旅遊前服用 10 mg。

一般兒童劑量：劑量尚未確立。

不良反應： 嗜睡、疲倦、體重增加、食慾增加、口乾。

交互作用：

- 當與酒精、安眠藥，或鎮靜劑合用時會產生過度鎮靜現象。
- Flunarizine 的藥物動力學並不受到 topiramate 影響。併用 topiramate（每 12 小時 50 mg），偏頭痛病人的 flunarizine 全身暴露量會增加 16%，相較於只使用 flunarizine 的病人則增加 14%。Topiramate 的穩定態藥物動力學性質並不會受到 flunarizine 影響。
- 長期使用 flunarizine 並不會影響 phenytoin、carbamazepine、valproate 或 phenobarbital 的代謝清除。罹患癲癇並有服用抗癲癇藥品的病人通常

flunarizine 的血中濃度會低於使用相同劑量的健康受試者。併用 flunarizine 並不會影響 carbamazepine、valproate 和 phenytoin 的血漿蛋白質結合能力。

- 注意事項：
1. 空腹或與食物一起服用皆可。
  2. 勿與含酒精性飲料併服。
  3. 服藥期間請小心開車或操作危險機械。
  4. 有抑鬱病史，目前有帕金森氏症，其他錐體束外異常之患者，不建議使用。

懷 孕 期： 人類懷孕期間使用本藥之安全性報告尚未建立。

授 乳 期： 尚無 Flunarizine 於人體乳汁中分泌之數據，不建議授乳期之婦女使用本藥。

儲 存： 15°C~30°C，避光儲存。