

Tamsulosin HCl

【OHARO】Harnalidge® OCAS® 0.4mg/Tab

ATC Code : G04CA02

中文名：活路利淨 OCAS 持續性藥效膜衣錠 《安斯泰來》

適應症：良性前列腺肥大症所伴隨的下泌尿道症狀。

藥理分類：Alpha₁ Blocker.

用法用量：Administration:

- It is better to take under empty stomach due to the food will increase its exposure.
- Do NOT crush or chew tablet. (OCAS: Oral Controlled Absorption System)

Indications and Dosage regimens:

Benign prostatic hyperplasia:

From Micromedex, 2022:

Initially: 0.4 mg QD; titration, may increase dose after 2-4 weeks.

Maintenance: 0.4-0.8 mg QD.

仿單：

- 起始劑量為 tamsulosin 0.2 mg，每天一次，若反應不佳時，劑量可增加為 Harnalidge® OCAS® 0.4 mg 一天一粒。
- 宜空腹使用，因食物會增加本藥暴露量。
- 整粒吞服，不可磨碎或咀嚼，因為會干擾有效成分的持續性藥效。
- 由於高齡者有時有腎功能低下的情形，對腎功能低下者宜由 0.1 mg 開始投與，經過充分的觀察才增量至 0.2 mg。由於本藥的單位含量較高，因此不建議使用於上述病患。
- 輕度至中度肝功能不全的患者無須調整劑量。

Note: If tamsulosin is discontinued for several days, therapy with the drug should be reinstituted at the lower daily dosage.

不良反應：可能引起射精異常、背痛、腹瀉、暈眩、頭痛、流鼻水、疲倦、思睡等。

交互作用：1. Tamsulosin 主要經由 CYP3A4 與 CYP2D6 廣泛代謝，不應將本藥與 CYP3A4 強效抑制劑（如 ketoconazole）合併使用。

2. 而與 CYP3A4 中度（如 erythromycin）抑制劑併用，或與 CYP2D6 強效（如 paroxetine）或中度（如 terbinafine）抑制劑併用，特別是已知的 CYP2D6 緩慢代謝病患應謹慎。

3. cimetidine：會使 tamsulosin 的血漿濃度上升。

注意事項：1. 宜空腹使用。整粒吞服，不可嚼碎或磨碎後服用。

2. Harnalidge OCAS® 不使用於女性。

3. 腎功能障礙者禁用本劑。

4. 姿勢性低血壓病史的患者、嚴重肝功能不全的患者禁用本品。

5. 使用本藥若出現姿勢性低血壓的早期徵兆時（頭暈、無力），患者應該坐下或躺下直到症狀消失。

6. 使用本藥期間有發生暈眩之可能，駕駛及機械操作者須特別留意。

懷孕期：Harnalidge® OCAS® 不適用於女性。

授乳期：Harnalidge® OCAS® 不適用於女性。