

Dimethylpolysiloxane (Simethicone)

【OKAS】Kascoal[®] 40 mg/Tab

ATC Code : A03AX13

中文名： 加斯克兒錠 «永信»

適應症： 解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【OGASL】Gaslan[®] 40 mg/Tab

ATC Code : A03AX13

中文名： 加斯朗錠 «井田»

適應症： 解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【O2GASCL】Gascon Drop (Wilcon[®]) 20mg/mL, 300mL/Bot

ATC Code : A03AX13

中文名： 胃爾康懸浮液 «聯邦化學»

適應症： 解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

藥理分類： **Antiflatulent.**

作用機轉： Decreases the surface tension of gas bubbles thereby disperses and prevents gas pockets in the GI system.

用法用量： **Administration: orally taken.**

Indications and dosage regimens:

1. 腹部膨滿感及鼓腸：通常成人一次 2ml(40mg)，一日三次，飯後或飯間服用。
2. 胃照相機胃鏡檢查時驅除胃內氣體：於攝影前 15-40 分前，通常大人 1~2ml (20mg-40mg)與 10mL 水同時服用。
3. X 光攝影時驅除腸內氣體：攝影 3 至 4 天前一次，2~4mL (40mg-80mg)，一日三次飯後或飯間服用。

不良反應：軟便，腸胃不適，腹瀉，腹痛，嘔吐，胃部重壓感，食慾不振。

注意事項：1. 建議飯後服用。

2. 使用前，充分振搖均勻。使用後瓶蓋栓緊。

3. 本劑在體內不被吸收，非腸道亢奮劑且非吸著劑，無便秘作用，具有適度的緩下作用。

4. Not to exceed a maximum daily dose of 500 mg/day. (UpToDate, 2020)

授乳期：不建議授乳婦自行使用。

儲存：室溫避光，緊密容器內保存。

備註：僅備於胃鏡支氣管室使用，門診藥局及住院藥局均無備存。