

Carbidopa 25mg, Levodopa 100mg

【OLEC】Lecadopa® 25/100 Tab

ATC Code : N04BA02

中文名： 克帕樂 25/100 錠 《瑩碩生技》

適應症： 帕金森氏症及綜合病症（肌肉強直及運動遲緩、震顫、流涎、吞嚥困難及姿勢不穩）。

成 分： Each tablet contains:

Carbidopa 25 mg, Levodopa 100 mg

藥理分類： **Anti-Parkinson Agent, Decarboxylase Inhibitor; Dopamine Precursor.**

用法用量： **Administration:** Administer with meals to decrease GI upset.

Parkinsonian syndrome:

- Initial, 1 tab TID; increase by 1 tablet daily or every other day to 8 tablets daily.
- Maintenance, individualize; minimum of 70-100 mg carbidopa daily to minimize nausea and vomiting, MAX 200 mg carbidopa (8 tablets) daily.
- Conversion from levodopa monotherapy, levodopa should be discontinued at least 12 hr prior to initiation of treatment with carbidopa/levodopa, which daily dose should be 25% of the previous levodopa dosage.

Restless legs syndrome:

1 tablet once daily at bedtime, may repeat dose if awakening within 2 hr.

不良反應： 食慾降低、噁心、嘔吐、動作障礙或困難、頭暈、失眠、做惡夢、幻覺、精神混亂等。

交互作用：

- 若與降壓藥合併使用時，容易發生姿勢性低血壓的情形，故需調整劑量。
- 與 TCA 或 MAOI(MAO-B inhibitor)等抗抑鬱劑合併使用，曾發生高血壓及運動困難。
- Phenytoin: ↓ levodopa effectiveness.
- Linezolid, methylene blue: may result in hypertensive crisis.
- Sulpiride, metoclopramide: ↓ efficacy of either drug.
- Haloperidol: loss of antiparkinson efficacy.
- Isoniazid: may result in symptomatic deterioration of Parkinson's disease.
- Iron: ↓ carbidopa or levodopa effectiveness.
- High protein food: ↓ levodopa concentrations.

注意事項：

1. 建議與食物一起服用以減少腸胃副作用。需要時，本錠劑可以剝半使用。
2. 服藥後尿液可能變深色。
3. 服藥期間，避免由躺臥或坐姿突然站起來，以免造成暈眩。
4. 服藥期間，避免長途開車及操作危險器械。

禁 忌：

1. 不可與無選擇性的 MAOI 合併使用，須於本劑開始治療前兩週停用 MAOI。
2. 不可用於閉鎖性青光眼的患者。
3. 不建議用於藥物引起的錐體外反應。

懷孕期： 須衡量本藥品帶來的益處與可能的風險。

授乳期： 尚未知 levodopa / carbidopa 是否會分泌至乳汁中。