

Calcitriol (1 α , 25-Dihydroxycholecalciferol)

【OMAC】 Macalol® 0.5mcg/Soft Cap

ATC Code : A11CC04

中文名：骨活醇軟膠囊 《漁人》

適應症：佝僂症、軟骨症、維他命 D 缺乏症、停經後骨質疏鬆症。

藥理分類：Vitamin D Analog.

用法用量：Administration：飯前或飯後服用皆可。與食物一起服用可減輕腸胃不適。

Dosage regimens :

初劑量為一天一粒，必要時可每隔 2~4 週每天之劑量增加一粒。

大多數人一天服用 1~4 粒，即可獲得滿意之效果。

不良反應：過量可能會引起虛弱、頭痛、食慾不振、噁心、便秘、腹瀉、劇渴、多尿，或肌肉痛、骨頭痛等。

交互作用：

- Aluminum Hydroxide: ↑ concentration of Aluminum Hydroxide.
- Sucralfate: ↑ concentration of Sucralfate.
- CarBAMazepine, PHENobarbital, Phenytoin, RifAMPin: ↓ the serum concentration of Calcitriol

注意事項：

- 1.高鈣血症、維他命 D 過多症者禁用。
- 2.在治療期間提供適當鈣的補充，因本劑的效用依賴鈣的充分攝取，成人每日鈣的最佳攝取量為 1000mg。
- 3.治療期間不可服用含鎂制酸劑或緩瀉劑。
- 4.注意嘔吐、虛弱、肌肉或骨骼疼痛之發生，因這些症狀可能表示高鈣血症。

懷孕期：

- 1.懷孕期間應特別小心使用。
2. Adverse effects have been observed in some animal reproduction studies.
3. If calcitriol is used for the management of hypoparathyroidism in pregnancy, dose adjustments may be needed as pregnancy progresses and again following delivery. Vitamin D and calcium levels should be monitored closely and kept in the lower normal range (Callies 1998).

授乳期：

Low levels of calcitriol are found in breast milk (~2 pg/mL).