

## Nordazepam

【ONAR】 Nargin F.C.<sup>®</sup> 5mg/Tab

ATC Code : N05BA16

中文名： 納靜膜衣錠 «萬宇康»

適應症： 焦慮、緊張所引起的精神障礙。

藥理分類： Benzodiazepines.

用法用量： Safety and efficacy not established in children. Not indicated for use in children.

### Administration:

Orally, taken without regard to meals.

### Dosage regimen:

Adults: 5 mg two or three times daily.

禁忌： 重症肌無力患者、孕婦、授乳婦。

不良反應： 嗜睡、頭暈。過量可能導致運動失調、步伐呆滯。

交互作用：

- **Azelastine (Nasal), Flunarizine:** ↑ the CNS depressant effect. Avoid combination.
- **Buprenorphine, CNS depressants, flunitrazepam, Hydroxyzine, Zolpidem, Opioid Agonists, Alcohol:** ↑ the CNS depressant effect. Consider therapy modification.

注意事項：

1. 空腹或與食物一起服用皆可。
2. 服藥期間應避免心開車或操作危險機械。
  1. 酒精會增加本藥的效力，應避免喝酒。
  2. 與其他抗焦慮藥或安眠藥並用時須小心。
  3. 白天服用此藥可能降低反射運動。
  4. 長期使用可能導致心理上的依賴。

懷孕期： 禁用。

授乳期： 禁用。