

Alogliptin, Pioglitazone

【OOSSEN】 Oseni® 25mg/30mg Tablet

ATC Code : A10BD09

中文名：歐欣尼膜衣錠 25/30 『台灣武田』

適應症：可用於以下狀況之成年第二型糖尿病治療：

- (1)使用 alogliptin 單方每日 25 mg 或 pioglitazone 單方每日 30 mg 治療仍控制不佳者。
- (2)與 metformin 併用，本品適用於已使用 alogliptin 每日 25 mg 加 metformin(使用劑量 ≥ 每日 1500 mg 或已達最高耐受劑量)治療仍控制血糖不佳者、或已使用 pioglitazone 每日 15 或 30mg 加上 metformin(使用劑量 ≥ 全每日 1500 mg 或已達最高耐受劑量)治療仍控制血糖不佳者。
- (3)已使用 alogliptin 以及 pioglitazone 控制良好的患者，可與本藥品互換使用。

成 分：Pioglitazone HCl 30 mg

Alogliptin..... 25 mg

藥理分類：Antidiabetic Agent, Dipeptidyl Peptidase 4 (DPP-4) Inhibitor; Thiazolidinedione.

用法用量：**Administration:** Orally taken once daily and can be taken with or without food. The tablets must not be split before swallowing.

Dosage regimen: 1 Tab QD

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

不良反應：低血糖、水腫、上呼吸道感染、背痛、頭痛、鼻咽炎。

交互作用：

1. **Gemfibrozil:** ↑ pioglitazone exposure.
2. **Fluoroquinolones:** ↑ risk of hypoglycemia or hyperglycemia.
3. **Hydroxychloroquine:** hypoglycemia.
4. **Clopidogrel, Leflunomide:** ↑ the serum concentration of Pioglitazone.
5. **Rifampin:** ↓ pioglitazone exposure.
6. **PPIs:** ↑ risk of osteoporosis or fracture.
7. **MAOIs, SSRIs:** ↑ the hypoglycemic effect.
8. **Pregabalin:** ↑ the fluid-retaining effect of pioglitazone.
9. **ACEIs:** ↑ the risk of angioedema. (ACEIS related)

注意事項：1. 飯前或飯後服用均可。本藥應整粒吞服，不可剝半。

2. 不建議用於有症狀的心臟衰竭患者(NYHA 第 III 級或第 IV 級)。

3. 腺臟炎病患，肝臟、腎臟功能不佳者，須謹慎使用並小心監測。

4. 服藥期間如有血尿、頻尿或排尿疼痛，請告訴醫師。

懷孕期：1.用於孕婦的數據有限，不足以確定藥物相關的重大出生缺陷和流產的風險。

2. Agents other than alogliptin are currently recommended to treat diabetes mellitus in pregnancy (ADA 2020).

哺乳期：沒有關於 pioglitazone 或 alogliptin 分泌到人類乳汁、對哺乳嬰兒或對乳汁分泌影響的資料。需衡量哺乳對發育及健康的益處與母親對 Oseni® 的臨床需求，以及 Oseni® 或母體疾病狀況對哺乳嬰兒的任何潛在不良反應。