

Qtern (Saxagliptin, Dapagliflozin)

【OQTE】 Qtern[®] 5/10 mg/Tab

ATC Code : A10BD21

中文名： 控糖穩膜衣錠 «AstraZeneca»

適應症： 用於下列第二型糖尿病患者:當 metformin 和 Qtern 中之單一成分無法達到充分的血糖控制時，以改善血糖控制；已使用 dapagliflozin 和 saxagliptin 的自由組合治療時。

成分： Each tablet contains:
Saxagliptin..... 5mg, Dapagliflozin10 mg

藥理分類： **Combination of DPP-4 Inhibitor and SGLT2 Inhibitor.**

用法用量： **Administration:**

- Orally, taken once daily in the morning, with or without food.
- Swallow tablets whole; do not crush, cut, or chew tablets.

Dosage regimen:

1 tab once daily in the morning.

Dosage adjustment in Renal Impairment:

eGFR \geq 45 mL/min/1.73 m²: No dosage adjustment necessary.

eGFR <45 mL/minute/1.73 m²: Use is contraindicated.

ESRD: Use is contraindicated.

Hemodialysis: Use is contraindicated.

Dosage adjustment in hepatic Impairment:

No dosage adjustment necessary; use with caution in severe impairment (has not been studied).

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

不良反應：泌尿道感染、鼻咽炎、上呼吸道感染、關節痛、腹瀉、血脂異常。

交互作用：

1. **CYP3A4 inhibitors** (Ketoconazole, clarithromycin, itraconazole, ritonavir) : ↑ Saxagliptin exposure. **Management:** limit the saxagliptin dose to 2.5 mg daily when combined with strong CYP3A4 inhibitors. When using the saxagliptin combination products, avoid use with strong CYP3A4 inhibitors.
2. **Fluoroquinolones** : ↑ risk of hypoglycemia or hyperglycemia.
3. **Hydroxychloroquine:** may result in hypoglycemia.

注意事項：1、腎絲球過濾率估計值 (eGFR) 低於 45 mL/min/1.73 m² 的病人，不應使用 Qtern[®]。

2、與其他血糖用藥併用須注意低血糖問題。

懷孕 期：不建議在懷孕第二孕期和第三孕期時使用 Qtern[®]。

授乳 期：因為 Qtern[®]可能對接受哺乳的嬰兒造成嚴重的不良反應(包括 Dapagliflozin 可能影響出生後的腎臟發育)，不建議在哺乳期間使用。