

Tenofovir Disoproxil Fumarate

【ORIC】Ricovir® 300mg/Tab

ATC Code : J05AF07

中文名：雷克威膜衣錠 300 毫克 《台灣邁蘭》

適應症：1.用於慢性 B 型肝炎者。

2.與其他抗反轉錄病毒藥物合併使用於成人 HIV-1 感染之治療。

藥理分類：**Antihepatnaviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleotide (Anti-HBV);**

Antiretroviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleotide (Anti-HIV).

用法用量：**Administration:** Orally, without regard to meals.

Dosage regimens:

300mg once daily

—Dosage for adults with renal impairment:

Clcr(mL/min)	Dosage
≥ 50	300 mg QD
30-49	300 mg once 48 hrs
10-29	300 mg once 72-96 hrs
Hemodialysis	300 mg once every 7 days

不良反應：癢癢、噁心、腹瀉、頭痛、抑鬱症、乳酸中毒、嚴重脂肪變性、肝腫大。

交互作用：

- NSAIDS: ↑ risk of acute renal failure.
- Orlistat: loss of virological control.
- Paxlovid® (Nirmatrelvir/Ritonavir): ↑ tenofovir exposure.

注意事項：
1.若有噁心、嘔吐、腹痛及呼吸急促或黃疸、深色尿液和白色糞便等情況，請立即回診就醫。

2.停用本品後應遵照醫師指示監測肝功能。

懷孕期：
若有需要，可考慮於懷孕期間使用本藥。

授乳期：
1.不建議 HIV 感染之母親哺乳。

2. In breastfeeding women with **hepatitis B infection (not coinfected with HIV)**, the American Association for the Study of Liver Disease chronic hepatitis B treatment guidelines **do not consider antiviral therapy a contraindication to breastfeeding**; antivirals are minimally excreted in breast milk and unlikely to cause significant toxicity.

3. ... females living with HIV infection should **completely avoid breastfeeding** to decrease the potential transmission of HIV (HHS [perinatal] 2019).

備註：本品健保處方限胃腸肝膽科醫師開立。