

Granisetron HCl

【OSET】 Setron® 1mg/Tab

ATC Code : A04AA02

中文名： 賜安特膜衣錠 1 毫克 《南光化學》

適應症： 預防及治療抗腫瘤化學療法與抗腫瘤放射線療法引起的噁心、嘔吐。

藥理分類： Antiemetic; Selective 5-HT3 Receptor Antagonist.

用法用量： Administration: Orally, take 1 hour before chemotherapy or radiation therapy.

Indications and dosage regimens:

Prevention of chemotherapy-associated nausea and vomiting:

- 2 mg QD up to 1 hour before chemotherapy or 1 mg BID; the first 1 mg dose should be given up to 1 hour before chemotherapy (with the second 1 mg dose 12 hours later).
- Administer only on the day(s) chemotherapy is given.

Prophylaxis of radiation therapy-associated emesis:

Oral: 2 mg once daily within 1 hour of radiation therapy.

不良反應： 虛弱，頭痛，嗜睡，發燒

交互作用：

- Fluconazole, voriconazole, azithromycin, clarithromycin, erythromycin, hydroxychloroquine, moxifloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, sertraline, quetiapine, chlorpromazine, prochlorperazine, sulpiride, dronedarone, donepezil, leuprolide, Alfuzosin: ↑ risk of QT interval prolongation.
- Bupropion, Lithium, codeine, morphine, nalbuphine: ↑ risk of serotonin syndrome.

注意事項： 1.用於抗腫瘤放射線療法引起的噁心及嘔吐時，最多持續至一週。

2.可能會降低腸的蠕動。

懷孕期： 1.只有當對母親之潛在益處大於對胎兒之潛在危險的前提下，才可於懷孕期間使用。

2. Adverse events have not been observed in animal reproduction studies. In an ex vivo placental perfusion study, granisetron was shown to cross the placenta.

授乳期： 尚未知 granisetron 是否會被分泌於人體乳汁中。只有當對母親之潛在益處大於對胎兒及受乳嬰兒之潛在危險的前提下，才可於哺乳期間使用。

儲存： 於室溫 30°C 以下乾燥處儲存。