

Sultamicillin Tosylate

【OUNA】Unasyn® 375mg/Tab

ATC Code : J01CR04

中文名： 優耐迅口服錠劑 «Pfizer»

適應症： 鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、陰性變形桿菌屬、檸檬酸菌屬、厭氧性細菌(Bacteroides fusobacterium, Clostridium difficile), Branhamella catarrhalis 引起之感染症。

藥理分類： Antibiotic, Penicillin.

用法用量： Administration: orally taken without regard to meals.

Indications and dosage regimens:

- Treatment is normally given for 5-14 days, but the treatment period may be extended if necessary.
- At least 10 days treatment for any infection caused by hemolytic streptococci to prevent the occurrence of acute rheumatic fever or glomerulonephritis.

Adults:

Usual dose: 1 tablet BID-TID, or 1~2 Tablets BID.

Uncomplicated gonorrhoea: single oral dose of 2.25 g (six 375 mg tablets).

Children and Infants:

< 30 kg:

25-50 mg/kg/day orally in two divided doses,
depending on the severity of the infection and the physician's judgement.

≥ 30 kg:

the usual adult dose should be given.

In Patients with Renal Impairment: (CCr ≤ 30 ml/min)

- The elimination kinetics of sulbactam and ampicillin are similarly affected and hence the plasma ratio of one to the other will remain constant.
- The dose in such patients should be administered less frequently in accordance with usual practice for ampicillin.

不良反應： 噫氣、嘔吐、腹瀉、偽膜性結腸炎、SGOT 與 SGPT 暫時性升高、黃疸、類過敏反應等。

注意事項： 1.原則上依據藥物敏感性試驗結果，給予最短的療程，避免抗藥菌株之產生。
2.可隨食物或不隨食物服用此藥。若引起肚子不舒服則與食物一起服用。請以適量水一起服用，服藥後不要立即躺下，睡前服用需特別小心。
3.老年人及嚴重腎功能不佳者須謹慎使用。
4.病人口服進食有困難或正使用非胃腸道方式提供營養或病人衰弱者(可能出現維他命 K 缺乏的症狀)，這類病人需小心嚴密觀察。

交互作用： 1. 抗凝血劑(如 Warfarin): 增加出血機會

2. 口服避孕藥: 降低避孕效果

3. Methotrexate: MTX 毒性增加

懷孕期： 動物試驗顯示，高劑量 ampicillin 有致畸胎作用，當益處高於潛在風險時才使用此藥。

授乳期： Ampicillim 會分泌至乳汁，授乳婦使用此藥時應停止授乳。

備註： Sultamicillin 為 ampicillin-sulbactam 之 prodrug。