

Bethanechol

【OUREC】Bethanechol 25mg/Tab

ATC Code : N07AB02

中文名： 滯尿通錠 25 毫克 «強生»

適應症： 麻痺性腸塞絞痛、迷走神經切斷手術後之胃弛緩及胃內貯留症、手術後及產後等之尿閉症、腹部膨滿。

藥理分類： Cholinergic Agonist

用法用量： **Administration:** orally, taken 1 hour before or 2 hours after meals. (to avoid nausea and vomiting).

Indications and dosage regimens:

Neurogenic bladder atony with retention / Postoperative nonobstructive urinary retention:

— Adults: initial, 5-10 mg orally repeated hourly until satisfactory response, MAX. 50 mg. maintenance, 10-50 mg orally 3-4 times daily

— Pediatric:

Children and Adolescents:

0.3 to 0.6 mg/kg/day in 3 to 4 divided doses; maximum dose: 10 mg/dose for children.

Note: Usual adult dose is 10 to 50 mg 3 to 4 times daily (*Gearhart 2010; Goldman 2012; Kliegman 2007*)

不良反應： 視力改變、腹瀉、暈眩、頻尿、頭痛、唾液或汗水增多、噁心、嘔吐、打嗝。

注意事項： 1.空腹(飯前 1 小時或飯後 2 小時)服用。
2.用藥期間注意血壓變化。
3.禁用於支氣管氣喘、甲狀腺機能亢進、消化性潰瘍、孕婦、冠狀動脈閉塞、癲癇、帕金森氏症之患者。
4.Bethanechol 服用過量，atropine 為其解毒劑。一般 atropine 成人劑量為 0.6 mg 每 2 小時重覆給藥，嬰兒及 12 歲以上孩童劑量 0.01 mg/kg (MAX 0.4 mg/dose) 每 2 小時重覆給藥，直至預期效果。

懷 孕 期： 禁止使用於孕婦。

授 乳 期： 尚未知 bethanechol 是否會分泌至人類乳汁中，接受本品治療時，應停止哺乳。

儲 存： 本劑易潮解，應密罐儲存。