

Benzbromarone

【OURI】 Urinorm (Benzon[®]) 50mg/Tab

ATC Code : M04AB03

中文名：必消痛錠 «信東»

適應症：痛風、高尿酸血症。

藥理分類：Uricosuric agent, non-competitive inhibitor of xanthine oxidase.

用法用量：**Administration:** Orally, take without regard to meals.

Dosage regimen: Usual dose: 50-200 mg/day.

交互作用：

- Warfarin: ↑ the serum concentration of Warfarin.
- Pyrazinamide: ↓ the therapeutic effect of Benzbromarone.

不良反應：噁心、下痢、食慾不振、全身倦怠、尿酸結晶、S-GOT 或 S-GPT Alkaliphosphatase 值上升。

禁忌：急性痛風期（此藥可能會引發急性痛風或尿酸性腎病變，故不可於急性痛風期使用。）

注意事項：

1. 飯前或飯後服用均可。
2. 腎功能異常之患者，建議酌予減量。
3. 重度肝功能異常之患者應小心使用。
4. 因為本品之血中尿酸降低作用很明顯，故於投予初期有誘發痛風的可能。
5. 非限水病人須增加水分攝取，避免尿液成酸性時可能由尿酸結石產生血尿，易引起腎疝痛等症狀。
6. 初使用之前 6 個月內及長期投予時，應定期進行肝功能檢查。

懷孕期：懷孕及可能懷孕的婦女禁用。
動物實驗結果顯示本藥有催畸形作用，妊婦或可能已妊娠之婦人不可投與之。

授乳期：授乳中的婦人，最好不要投與本劑，若一定要投與本劑則不要授乳。（授乳中投與本劑的安全性不確定）