

Silodosin

【OURI8】 Uriel® 8mg/Tab

ATC Code : G04CA04

中文名：優列扶膠囊 《健喬信元》

適應症：前列腺肥大症所伴隨的排尿障礙。

藥理分類：**Alpha 1 Blocker.**

用法用量：
–Usual dosage:

PO, 8 mg QD with a meal.

–Renal Impairment

CrCl >50 mL/minute: No dosage adjustment necessary.

CrCl 30-50 mL/min: 2 mg BID or 4mg QD with a meal.

–Hepatic Impairment:

Child-Pugh A or B: No dosage adjustment necessary.

不良反應：射精障礙、起身時暈眩、口渴、腹瀉、頭暈、搖晃感、鼻塞。

禁 忌：
1. 嚴重腎功能障礙者(CrCl < 30 mL/min)禁用。

2. 嚴重肝功能障礙者(Child-Pugh score ≥ 10)禁用。

交互作用：

1. Mainly metabolized by cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) , UDP-glucuronosyltransferase, alcohol dehydrogenase, and aldehyde dehydrogenase.
2. **CYP3A4 inhibitor** (Ketoconazole, Clarithromycin, Itraconazole, Ritonavir; diltiazem, erythromycin, verapamil): ↑ serum level of Silodosin.
3. Alpha1-Blockers may ↓ the vasoconstricting effect of **Alpha1-Agonists**. Similarly, Alpha1-Agonists may ↓ Alpha1-Blocker vasodilation.
4. Alpha1-Blockers may ↑ the hypotensive effect of **Calcium Channel Blockers**.
5. Alpha1-Blockers (Uroselective) :↑ the hypotensive effect of **Phosphodiesterase 5 Inhibitors** (Avanafil, Mirodenafil, Sildenafil, Tadalafil, Udenafil, Vardenafil).

注意事項：
1. 本品不適用於女性、兒童。
2. 飯後(與食物一起)服用，以降低副作用產生的風險。
2. 變換姿勢(如:起床)要緩慢，以免跌倒。
3. 可能造成暈眩，駕駛及機械操作者須特別留意。

懷孕期：
Uriel® 不適用於女性。

懷孕期及哺乳期的老鼠投與 silodosin 300 mg/kg/day，皆未觀察到對其子代有外觀肢體及行為發展上有影響。

授乳期：
Uriel® 不適用於女性。

懷孕期及哺乳期的老鼠投與 silodosin 300 mg/kg/day，皆未觀察到對其子代有外觀肢體及行為發展上有影響。