

Tadalafil

【OVET】Vetawon® F.C. Tablets 5mg

ATC Code : G04BE08

中文名：佳倍壯膜衣錠 5 毫克 «永信藥品»

適應症：1.治療勃起功能障礙。2.良性攝護腺(前列腺)肥大症所伴隨的下泌尿道症狀。

藥理分類：Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitor.

用法用量：Administration:

- Oral: May be administered with or without food.
- Do not split tablets; the entire dose should be taken.
- When used on an **as-needed basis**, should be taken **at least 30 minutes prior** to sexual activity.
- When used on a **once-daily basis**, should be taken **at the same time each day**, without regard to timing of sexual activity.

Dosage regimens:

勃起功能障礙 (固定每日服用)：

- 起始劑量 **2.5mg QD**，並儘量在每天的同一時間服藥，與性行為之發生時間無關。
- 可增至 **5mg QD**。

良性攝護腺肥大：

- 起始劑量為 **2.5mg QD**，並儘量在每天的同一時間服藥，
- 可增至 **5mg QD**。
- 與 finasteride 併用：5mg QD x 26 週，每天在大約相同的時間服藥。

Dosage adjustment:

腎臟功能不全：

-勃起功能障礙

- 肌酸酐清除率 < 30 mL/min 或需要血液透析者：不建議每日服用。

-良性攝護腺肥大及勃起功能障礙併有良性攝護腺肥大

- 肌酸酐清除率為 30-50 mL/min：建議起始劑量為 2.5 毫克，可根據病人反應增至 5 毫克。
- 肌酸酐清除率 < 30 mL/min 或需要血液透析者：不建議每日服用。

肝臟功能不全：

- 輕度或中度肝臟功能不全(Child Pugh Class A 或 B)：尚未於肝功能不全的病人做廣泛的評估，因此一天一次給這類病人時應謹慎小心。
- 嚴重肝臟功能不全(Child Pugh Class C)：不建議使用。

不良反應：頭痛、鼻咽炎、消化不良、上呼吸道感染、潮紅、肌肉痛、咳嗽、腹瀉、鼻塞高血壓。

交互作用：

- Paxlovid® (nirmatrelvir/**ritonavir**): ↑ risk of sildenafil adverse effects (hypotension, syncope, visual changes, priapism).
※**Ritonavir**: a protease inhibitor, a CYP3A inhibitor
- Nitroprusside, nitroglycerin, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate : ↑ hypotensive effects.
- Clarithromycin, Itraconazole, Ketoconazole (Systemic), MiFEPRIStone, Ritonavir, Voriconazole: ↑ sildenafil plasma concentrations.

注意事項：

1. 可與食物或不與食物併用。佳倍壯錠劑不可剝半，應整顆服用。
2. 服用**硝酸鹽類**藥品之病患，**禁止服用本劑**。(會加強 nitrates 類藥物的降壓效果)
3. **不建議服用 Tadalafil 的病人併用 alpha 阻斷劑**來治療良性攝護腺肥大
4. 對於同時服用 CYP3A4 抑制劑，如 ketoconazole 或 ritonavir 之病人，**Tadalafil 最大建議劑量為 2.5 毫克**。

懷 孕 期：

1. Vetawon[®]不適用於女性。
2. 尚無孕婦使用 Vetawon[®]之資料以告知任何不良發育結果的藥物相關風險。

授 乳 期：

Vetawon[®]不適用於女性。目前並沒有任何有關其會分泌進入母乳中的資料。

備 註：

本品健保不給付。