

Alfuzosin HCl

【OXAT】Xatral XL Tab 10mg

ATC Code : G04CA01

中文名： 扎特持續性藥效錠 『Sanofi』

適應症： 良性前列腺肥大

藥理分類： Alpha 1 Blocker

用法用量： **Administration:** Orally, immediately following a meal at the same time each day.
Swallow tablet whole; do not crush or chew.

Indications and dosage regimens:

Benign prostatic hyperplasia (BPH):

10 mg QD

Moderate or severe hepatic impairment, severe renal impairment ($\text{CrCl} < 30 \text{ mL/min}$): **contraindicated**

不良反應：暈眩、頭痛、疲倦

- 交互作用：
- Ritonavir: ↑ level of alfuzosin.
 - Azithromycin, Clarithromycin, erythromycin: ↑ level of alfuzosin.
 - Sildenafil, tadalafil, vardenafil: ↑ risk of orthostatic hypotensive effect.
 - Fluconazole, itraconazole, ketoconazole: ↑ level of alfuzosin.
 - Cisapride: ↑ risk of QT-interval prolongation.
 - Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir): ↑ alfuzosin exposure.
 - Fluoroquinolones, imipramine, propafenone, quetiapine, sertraline, sulpiride, hydroxychloroquine, donepezil, dronedarone: ↑ risk of QT-interval prolongation.

注意事項：
1.可能會造成暈眩，所以起床行動時要緩慢起身，勿直接下床，注意避免跌倒。
2.使用本藥之治療初期可能發生姿勢性低血壓，駕駛及機械操作者須特別留意。
3.此藥應整錠以足量的液體吞服，不可嚼碎、分割或磨碎。

懷孕期：此藥不適用於女性。

授乳期：此藥不適用於女性。