

Zolpidem Hemitartrate

【OSTIL】Zolpidem F.C. Tablets 10mg

ATC Code : N05CF02

中文名： 柔拍膜衣錠 10 毫克 《中化裕民》

適應症： 失眠症。

藥理分類： **Hypnotic, Miscellaneous.**

用法用量： Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

**Administration: orally, take** immediately before going to bed when ready to go to sleep. Onset of sleep may be facilitated by taking the drug on an empty stomach.

— Adults < 65 yrs:

5-10 mg at bedtime. Maximum daily dose: 10 mg.

— Adults > 65 yrs, liver disease or debilitated patients:

5 mg at bedtime.

— Renal impairment: < 65 yrs, 5 mg; > 65 yrs, 2.5 mg

不良反應： 頭暈、頭痛、記憶障礙（健忘）、腹瀉。

注意事項： 1. 睡前服用或坐於床上服用。  
2. 服藥期間應避免心開車或操作危險機械。  
3. 服用本品可能出現夢遊行為，如開車、打電話及準備與食用食物。

懷 孕 期： 不建議使用。

授 乳 期： 授乳婦不宜使用本品。

使用規定： 全民健保--摘要：

1.非精神科醫師、神經科專科醫師若需開立本類藥品，每日不宜超過一顆，連續治療期間不宜超過6個月。若因病情需長期使用，病歷應載明原因，必要時轉精神科、神經科專科醫師評估其繼續使用的適當性。

2.精神科、神經科專科醫師應針對必須連續使用本藥的個案，提出合理的診斷，並在病歷上詳細記錄。

3.對於半年內首次就診尚未建立穩定醫病關係之病患，限處方7日內安眠藥管制藥品。