

Domperidone

【OWEM】Wempty® Suspension 60mg/60 mL/Bot

ATC Code : A03FA03

中文名：胃利空懸液劑 «晟德»

適應症：噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。

藥理分類：Dopamine Antagonist; Gastrointestinal Agent, Prokinetic.

用法用量：**Administration:** Orally, in GI motility disorders, administer 15 to 30 minutes prior to meals and at bedtime if needed.

Indications and Dosage regimens:

GI motility disorders (diabetic gastroparesis, gastritis), Nausea/vomiting associated with dopamine-agonist anti-Parkinson agents:

Adults & adolescents \geq 35 kg:

10 mL up to 3 times daily, 15-30 minutes before meals and at bedtime.

Children (under 12 years of age and weighing less than 35kg):

0.25 mL/kg up to 3 times daily.

不良反應：頭痛、口乾、焦慮、血漿中泌乳激素(prolactin)濃度上升。

交互作用：

- Ticagrelor, isoniazid, paroxetine, galantamine, quetiapine, sulpiride, sertraline, fluoroquinolones, hydroxychloroquine, amiodarone, dronedarone, fluconazole, ketoconazole, voriconazole, verapamil, solifenacin, alfuzosin: ↑ risk of QT interval prolongation.
- Ritonavir: ↑ domperidone exposure.

注意事項：

1. 飯前或睡前 15-30 分鐘服用。
2. 使用前請先震盪均勻。
3. 小兒（尤其 1 歲以下之乳幼兒）曾有錐體外徑症狀，應避免過量投予。而 3 歲以下之乳幼兒應避免連續使用超過 7 天。
4. 本劑與 phenothiazide 系製劑（如 chlorpromazine、prochlorperazine）、butyrophenone 系製劑（如 haloperidol、Rauwolfia alkaloid）並用，會產生內分泌調節異常及錐體外徑症狀。
5. Anticholinergic agents 會減弱本劑之促胃腸蠕動之作用及胃排空時間。

禁忌：勿與下列藥品併用，如 ketoconazole, 強力 CYP3A4 抑制劑。

懷孕期：對孕婦或是有可能懷孕的婦女，應在判斷投藥治療的效益遠超過危險性時，才能開具此藥。

授乳期：會分泌至乳汁，哺乳之婦女應避免大量投予。服用本藥者，不建議親自哺乳。