

Bevespi Aerosphere

【TBEV】 Bevespi® Aerosphere 7.2/5.0 mcg, 120 Puff/Bot *ATC Code : R03AL07*

中文名：必肺宜氣化噴霧劑 «Boehringer»

主成分：Each Dose contains：

Glycopyrronium (LAMA).....7.2mcg, Formoterol (LABA).....5mcg

LAMA: long-acting muscarinic antagonist; LABA: long-acting beta agonist

適應症：適用於阻塞性肺病病人氣流阻塞的長期維持治療。

藥理分類：**Anticholinergic Agent, Long-Acting; Beta2 Agonist, Long-Acting.**

用法用量：Adult: 2 Puff BID

不良反應：口乾、眩暈、心悸、心跳過速、高血壓、咳嗽、便秘。

注意事項：

1. 必肺宜氣化噴霧劑不適用於治療氣喘。
2. 用法是每天兩次，早晚各一次，每次吸入兩下，僅供口腔吸入使用。不可超過每天兩次，每次吸入兩下。
3. 吸入器使用步驟請詳閱說明書。
4. 每罐含有 120 次吸入量。藥罐附有一個劑量顯示器，指示剩餘吸入次數。劑量顯示器的顯示，會在每啟動十次後移動。
5. 在每次噴霧前振搖均勻。
6. 當吸入器超過 7 天未使用時，必須重新進行裝填(對空釋放 2 次噴霧)。
7. 在開始使用的前三週，每週清潔吸入器一次。

懷 孕 期：

1. 只有在預期效益大於對胎兒的潛在危險時，才可以在懷孕期間使用 Bevespi aerosphere。
2. 建議婦女若在使用 Bevespi aerosphere 期間懷孕，應與醫師聯繫。

授 乳 期：

1. 目前仍未知 Bevespi aerosphere 是否會分泌進入人類的乳汁中。
2. 由於許多藥物都會分泌進入人類的乳汁且曾在哺乳大鼠的乳汁中檢測到 formoterol fumarate，所以 Bevespi aerosphere 應謹慎用於授乳婦。
3. 由於目前尚無哺乳母親使用 Bevespi aerosphere 的對照組試驗數據，因此應考慮 BEVESPI aerosphere 對母親的重要性，作出停止哺乳或停用 Bevespi aerosphere 決定。