

Pilocarpine HCl

【OSALA】 Salagen<sup>®</sup> 5mg/Tab

ATC Code : N07AX01

中文名： 舒樂津錠劑 «Patheon»

適應症： 因頭頸部癌放射線治療造成唾腺功能減低而引起的口乾燥症。  
Sjogren's Syndrome 所引起的口乾燥症。

藥理分類： **Cholinergic Agonist.**

用法用量： **Administration: orally**, taken with or without food.

**Note:** Avoid administering with high-fat meal. Ensure adequate water intake (dehydration may develop with use).

**Indications and dosage regimens:**

**Xerostomia caused by radiotherapy for cancer of the head and neck :**

Initially, 5 mg TID;  
maintenance, 15-30 mg/day ;  
Max: 10 mg/dose.

**Xerostomia associated with Sjogren's Syndrome:**

5 mg QID.

不良反應： 流汗、噁心、鼻炎、發冷、臉潮紅、頻尿、頭昏和無力。

注意事項：

1. 可於飯前或飯後服用。
2. Pilocarpine 會造成視覺干擾，尤其在晚上可能會影響行車的安全。
3. 如果服用 pilocarpine 而流汗過多，需注意水分補充，以防脫水現象發生。
4. 嚴重肝功能障礙者不建議使用。

懷 孕 期： 孕婦只有在權衡過對用藥的好處及對胎兒的危險性後才可使用。

哺 乳 期： 停止授乳或停止用藥應視本品對授乳婦的重要性而定。