Tapcom-S

【TTAP】Tapcom-S® Ophthalmic Solution 0.3 mL/Vial *ATC Code：S01ED51*

中文名： 複方泰福羅坦(單支裝)眼藥水 «Santen»

適應症： 使用於對乙型阻斷劑或前列腺素衍生物類局部單一藥物治療反應不佳，而需要使用複方藥物與無防腐劑點眼液的隅角開放性青光眼或高眼壓成人病患，以降低眼內壓。

成　　分：Each mL contains:
Tafluprost …… 0.015 mg, Timolol ……5mg

藥理分類： Ophthalmic Agent, Antiglaucoma; Beta-Blocker, Nonselective; Prostaglandin.

用法用量： **Administration:** for Ophthalmic use.

Indications and dosage regimens:

Ocular Hypertension/Open-angle Glaucoma:

1 drop applied to affected eye(s) once daily in the evening;

MAX I drop daily.

Safety and effectiveness not established in pediatric patients.

不良反應：眼睛刺激、眼睛不適、異物感、疼痛與搔癢、睫毛變長。

注意事項：

1. 於 1~25℃下避光保存。
2. 開封**鋁箔包裝**後，將**未使用**的單一劑量小瓶再放入鋁箔包裝內，於 1~25℃下可保存 1 個月。需丟棄**使用後剩下的**藥液(本藥為一次性使用無菌藥劑)。
3. 使用前，請先將最初 1-2 滴捨掉(為了除去開封時可能出現的容器碎片)。
4. 點藥期間不要戴隱形眼鏡，給藥 15 分鐘後再重新戴上。
5. 建議使用後用手指壓住鼻側之眼角（鼻淚管），並閉起眼瞼 2 分鐘，可降低全身吸收。這可能會減少全身性副作用並增進局部效果。
6. 使用本藥可能發生虹膜與眼瞼色素沉澱(黑色素增加)或眼周圍的多毛化。

禁　　忌：

1.患有實性心跳減慢症。
2.二級或三級房室傳導阻滯。
3.心臟性休克。
4.明顯心臟衰竭之病人。
5.重度過性鼻炎或支氣管過度敏感。
6.對本藥任一成份過敏者。

懷 孕 期：

- 除非確實需要，否則不可將 Tapcom-S®點眼液用於懷孕婦女。
- 具有生育能力的婦女必須採取有效避孕措施的女性

授 乳 期：

- 不建議將 Tapcom-S®點眼液用於哺乳婦女。
- 尚未知 Tafluprost 點眼液是否會分泌至人類乳汁中。動物研究發現 Tafluprost 及其代謝物會分泌至乳汁中。Timolol 也會分泌至乳汁中，然而 timolol 點眼液在治療劑量下對嬰兒而言，藥量過低不足以造成乙型阻斷作用。