

Sertaconazole Nitrate

【TZALG】Zalain® External gel 2% 30mL

ATC Code : D01AC14

中文名：達來外用凝膠 2% 《科進製藥》

適應症：治療頭皮之脂漏性皮膚炎及因黴菌感染所引起之頭皮屑。

藥理分類：Antifungal Agent, Imidazole Derivative; Topical.

用法用量：在頭皮或頭髮上塗抹適量本品，經 3~5 分鐘後再以清水沖洗，一週使用兩次，連續使用 2~4 週。

不良反應：曾有少數獨立的報告指出，在剛開始使用本品的前幾天，會輕微且短暫地出現紅斑反應，但是並無需停藥。

注意事項：

1. 本品供皮膚使用，不可用於眼部治療。
2. 需避開眼、口腔或陰道黏膜等部位。
3. 如使用 4 週後仍不見改善，需重新思考其病因，使用一般的衛生措施以控制感染源。
4. 已知對本品或其中任何一項賦型劑有過敏現象時，請勿使用本品。曾對咪唑類藥 (imidazole)產生過敏反應之病患需謹慎使用，應注意有交叉反應之可能 (cross-reactivity)。
5. 如先前使用過皮脂類固醇以治療脂漏性皮膚炎，請停藥兩週後再開始使用本品，以避免出現皮質類固醇誘發的致敏化作用。
6. 本品不適用於治療嬰兒脂漏性皮膚炎。
7. 對於 12 歲以下的兒童，本品的療效與安全性尚未確立。

懷 孕 期：根據 Zalain Cream 使用經驗，當大劑量局部使用後，仍未在血漿中偵測到。儘管如此，其對新生兒和孕婦之無害性仍未被證實。因此，對於孕婦和哺乳婦在使用本品前，應仔細評估其利益風險比。

授 乳 期：未知是否分泌至乳汁，授乳中婦女若要使用本藥品，仍應仔細評估其利益得失。

儲 存：存放於 30°C 以下乾燥處，避免陽光直射。