



T 型管膽道攝影檢查衛教指導

➤ 什麼是 T 型管膽道攝影？

T 型管膽道攝影檢查通常為外科手術後留置 T 型管，利用顯影劑注入，以檢查是否有殘餘結石，此檢查約在手術後 7~10 天做。

➤ 適應症：

1. 原因不明的黃疸：膽節石、良性及惡性膽道狹窄和異常。
2. 膽道結石、膽道管病變。
3. 不明原因的腹痛。

➤ 檢查前準備：

1. 檢查前必須禁食 4 小時(包括不要喝水)。
2. 檢查當天請進量穿著無金屬之衣褲。
3. 請家屬陪同檢查並填寫同意書。

➤ 檢查步驟：

1. 報到前可先排空膀胱。
2. 患者平躺於檢查台上。
3. 由醫師消毒 T 型管之出口及預注入顯影劑處。
4. 於 X 光透視下，經由患者的 T 型管將顯影劑注入膽道，調整檢查台角度或請病人更換姿勢後再攝影（共攝影數次）。
5. 檢查完畢，受檢者復位後，讓 T 型管接至引流袋自然引流。

➤ 檢查後注意事項：

1. T 型管之敷料需適當保持乾燥，以預防感染。
2. 觀察引流管周圍皮膚有無紅腫現象。
3. 翻身時勿牽扯 T 形管、亦勿將 T 形管綁於床欄或固定於床上，注意管子有無扭曲或受壓、牽扯及壓迫而造成阻塞。
4. 下床時引流袋應低於傷口或低於病人腰部以下，預防逆流，並隨時以手捏擠 T 形管，以保持通暢。
5. 觀察引流袋的引流量及顏色，若為紅色引流液須告知醫護人員。鼓勵病人翻身或早期下床活動，以利引流管引流。
6. T 型管與腹壁保持垂直，注意不可扭曲及滑落，若滑落時需儘速告知醫護人員或速返院以利處理。
7. 沒有醫囑不可以隨意沖洗、抽吸或夾住。
8. 拔除時間：手術後約 10-14 天作 T 型管攝影，並在術後約 3-4 週作膽道鏡檢查，若無結石存留，就可拔除引流管。

➤ 有下列不適時請盡快返院就診：

1. 畏寒、發燒
2. 劇烈腹痛、嘔吐、腹脹。

- 3.引流管脫出。
- 4.引流管呈紅色。
- 5.傷口有紅、腫、熱、痛或膿樣分泌物。

參考文獻：

孫宜欣、蔡麗紅、藍素珍(2012)・一位罹患膽結石術後併發膽道阻塞病患之護理經驗・長庚科技學刊，16(61-6)。



寶建醫療
社團法人

寶建醫院
PAOCHIEH HOSPITAL

關心您

總機：08-7665995

院址：屏東市中山路123號

救護專線：08-7330290

網址：www.paochien.com.tw