

## 電腦斷層檢查衛教指導



### 壹、目的：

- 一、檢查範圍依需要選擇頭部、頸部、胸部、腹部、四肢等不同部位進行掃描，診斷病變的部位，病灶的形狀、大小及其性狀。
- 二、對於腫瘤之分期及放射線治療之正確定位有很大的幫助。

### 貳、檢查前之準備：

- 一、需注射顯影劑者，需填寫電腦斷層檢查同意書。
- 二、禁食時間依排程時間往前推算禁食 4 小時以上（如不需注射顯影劑者，則不需禁食）。
- 三、可服用平日藥物（例如高血壓及心臟病藥物，但糖尿病藥物需暫停服用），糖尿病人可攜帶果或巧克力等，避免血壓過低。
- 四、更換檢查衣（檢查衣正穿，女性勿穿內衣），頭部電腦斷層除外，衣服上不要有金屬的飾物，因金屬物質會干擾電腦斷層影象，依照射部位的不同，取下髮飾、首飾、眼鏡、注聽器或是活動式假牙。
- 五、請排空膀胱。
- 六、依排檢時間至電腦斷層室進行檢查。
- 七、此檢查具放射線，有懷孕可能之病人請注意或避免，體弱或行動不變者需有家屬陪伴。
- 八、對於需施打顯影劑之患者，醫護人員會先建立靜脈軟針並行生理食鹽水注射以檢查血管通暢性。

### 參、檢查步驟：

- 一、安排臥位，注意保暖。
- 二、攝影過程保持固定不動。
- 三、注意是否出現顯影劑過敏情形。

### 肆、檢查後護理及衛教：

- 一、若可進食病人，檢查後應多喝水(2000~3000cc)，以利顯影劑排出。

二、注意有無對顯影劑過敏之反應，如皮膚癢、紅疹、發燒、呼吸困難等。



寶建醫療  
社團法人

寶建醫院  
PAOCHIEN HOSPITAL

關心您

總機：08-7665995

院址：屏東市中山路123號

救護專線：08-7330290

網址：www.paochien.com.tw