

## 經皮穿肝膽道及膽囊攝影引流術衛教指導



### 壹、目的：

緩解結石或腫瘤造成病人阻塞膽管炎而造成的敗血症黃疸症狀。

### 貳、檢查前之準備：

- 一、須填經皮穿肝膽道引流術及相關處置說明暨同意書。
- 二、檢查前禁食 6 小時(若全身麻醉即須 8 小時)。
  - (一)上午執行檢查，午夜 12 點開始禁食。
  - (二)下午執行檢查，當日早晨 8 點以後開始禁食。
- 三、更換檢查衣(檢查衣正穿)，並脫掉外褲、請排空膀胱。  
【如做無痛性檢查，則再加戴手術帽】。

### 參、檢查步驟：

在右側腋前腺第七、八肋間以細針穿刺，注射含碘之顯影劑，利用 X 光攝影。

### 肆、檢查後護理：

- 一、測量生命徵象。
- 二、觀察是否有對顯影劑引起不良反應及過敏現象，如：噁心、嘔吐、皮膚紅斑、呼吸困難、休克等。
- 三、觀察插管的傷口有無感染(紅、腫、熱、痛)、滲血情形。
- 四、維護管路通暢，避免擠壓，觀察引流液的顏色及量。
- 五、如無禁食，檢查後半小時就可以進食。
- 六、絕對臥床休息 8-12 小時。
- 七、在無其他禁忌下，可多攝取水份，以促進顯影劑排出。
- 八、若發生胸痛、呼吸困難、腹痛或任何不適情形請與醫護人員告知處理。

