

經動脈化療栓塞療法檢查衛教指導



壹、目的：

利用血管攝影之方式，將化學藥物或栓塞粒子注入供給腫瘤營養的肝動脈血管內，阻斷腫瘤氧氣及養分供給，造成肝腫瘤細胞毒性或缺氧壞死狀態，以達到毒殺腫瘤之效果。

貳、檢查前之準備：

- 一、須填寫檢查同意書及說明書。
- 二、執行檢查者，檢查前須禁食 6 小時以上(若全身麻醉須 8 小時)。
 - (一)上午執行檢查，午夜 12 點開始禁食。
 - (二)下午執行檢查，當日早晨 8 點後開始禁食。
- 三、檢查前需剃除兩側腹股溝處及恥骨聯合處之體毛。
- 四、送檢查前請排空膀胱。
- 五、協助更換檢查衣(檢查衣正穿)。

參、檢查後護理：

- 一、觀察生命徵象及穿刺傷口有無出血、末梢血循(顏色、溫度)、疼痛情形、監測雙足足背動脈搏動及狀況。
- 二、穿刺部位傷口彈性膠布需固定 24 小時，保持平躺，需大小便時可用尿壺、便盆或尿布等，穿刺部位勿彎曲，以免再次出血。
- 三、術後肢體可稍微活動及翻身，盡量翻向穿刺處，24 小時後若無出血情形即可下床活動。
- 四、栓塞治療者，術後在栓塞器官附近會疼痛、噁心、輕微發燒、食慾不振及上腹燒灼感，3-7 天左右，採症狀治療法，採清淡易消化飲食。
- 五、術後可立即進食，但進食時也請保持靜臥仰躺姿勢，因此術後 24 小時內需要家屬陪同照料。
- 六、檢查過程中有施打顯影劑，術後請多攝食水分以利顯影劑排出，並觀察尿量排出是否正常，限水者請依照臨床醫師指示給予水分。
- 七、一星期內勿提重物及撞擊到肝臟部位，避免出血。

