



週邊靜脈導管留置（靜脈注射）照護原則衛教指導

❖靜脈注射：是將一週邊靜脈導管暫時性的置放於靜脈中，進行輸液或給藥治療。

❖併發症：靜脈炎、阻塞、液體滲漏等。

❖照護原則：

1. 打上靜脈留置針時，針頭插入部位仍會有疼痛感，大約 10~20 分鐘後，疼痛會較減輕。
2. 維持點滴順暢，勿壓迫、扭曲或拉扯點滴管。
3. 下床活動時，點滴需高於注射部位約 90 公分以上，避免血液回流而阻塞。
4. 任何活動時，切記勿拉扯管路、勿碰撞注射部位，以避免造成滑脫。
5. 勿自行調整滴數，以免影響藥物作用或造成心肺不適。
6. 保持留置針處清潔乾燥：注射點滴期間可以用擦澡方式清潔身體，如淋濕可請護理人員協助；更換衣服時，若有需要，可請護理人員幫忙。
7. 靜脈留置針留置的手臂，勿用力提物。
8. 若點滴滴空，請勿自行關閉管夾，以免血液凝固在針頭處，造成導管阻塞；也不可自行拔除，以免造成打針處及管路髒污，造成發炎，可立即請護理人員處理。
9. 若注射部位周圍皮膚有發紅、蒼白、冰冷、腫脹、疼痛、點滴外漏、點滴不順暢或不滴，血液逆流或膠布鬆脫，請立即通知護理人員處理。
10. 若有任何關於點滴注射之問題請詢問護理人員。

參考文獻：

王月琴(2013)•體液的供給•於王月琴等編著，基本護理學下冊(五版，14-45~14-67 頁)•台北市：永大。

蘇惠珍、賴秋絨(2017)•體液供給•於蘇麗智等編著，基本護理學下冊(三版，239~255)•台北市：華杏。