

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Digoxin 病人衛教



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

隆我心錠 (Digoxin)

0.25 mg 白色



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

充血性心臟衰竭

Congestive Heart Failure (CHF)

意指慢性心臟衰竭,當心臟無法推送足量血流維持身體所需,心臟就會漸漸衰竭





寶建醫療
社團法人
寶建醫院
PAOCHIEH HOSPITAL

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



直接興奮心臟肌肉，使收縮力增加，增加心臟搏出量，使心跳加強，各器官循環得以改善，並可減輕腹水、全身性水腫，有利尿作用，使房室傳導時間延長，緩和心跳速率



藥物介紹 ▶ 治療疾病 ▶ 藥物作用 ▶ **使用方式** ▶ 監測濃度 ▶ 生活須知 ▶ 注意事項 ▶ 交互作用 ▶ 飲食注意

飯後2小時服用,避免同時和食物併用

若忘記服用,請於當日補服,勿隔日補服兩日份

每次服藥前測量並記錄您的心跳次數

當出現軟弱無力、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉時,可能是藥物過量的徵兆,此時請嚴密監測**心跳次數**

心跳**<60次/分**,請暫停服藥1 - 2天,停藥後若心跳仍持續**<60次/分**,應即刻就醫



藥物介紹 → 治療疾病 → 藥物作用 → 使用方式 → **監測濃度** → 生活須知 → 注意事項 → 交互作用 → 飲食注意

理想治療濃度


充血性心衰竭：0.8 ~ 2 ng/ml

心房心律不整：1.5 ~ 2.5 ng/ml



藥物監測原因

1. 標準情況下,未達到治療目標且未出現毒性
EX：腎功能不全,低血鉀,甲狀腺過高或低
2. 懷疑有毒性出現
EX：厭食,噁心嘔吐,黃綠色視覺,心律不整
3. 懷疑服藥順從性不佳或是藥物交互作用



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



1. 不能自行停藥,若有不適應立即就醫

2. 告訴醫生所服用的藥物

EX: 制酸劑, 抗生素, 利尿劑

3. 若要進行手術,告訴醫生正在服用此藥

4. 建議低鈉飲食,並補充鉀



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



老年人的腎功能衰弱,需要減少劑量



飲酒會增強嗜睡的副作用



若為懷孕或授乳婦,需要告知醫生

WARNING



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知


注意
事項

交互
作用

飲食
注意

制酸劑併服, 會減少吸收
→ 間隔**兩小時**以上

人蔘、甘草、車前草、山楂
→ 干擾其作用及濃度的測,
請勿服用



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



選擇**高鉀**食物

橘子、柳丁、香蕉、蔬菜

