

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項



NTG 病人衛教



藥物
介紹

治療
疾病


藥物
作用

使用
方式


生活
須知

注意
事項

耐絞寧錠 Nitroglycerin



NITROSTAT 0.6MG



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

生活
須知

注意
事項

狹心症之治療及預防

心肌缺血的症狀,可能引起鈍痛或脹痛,感覺胸腔受到壓迫或緊縮,也常伴隨有喘氣、噁心、冒汗、頭暈等症狀



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式


生活
須知

注意
事項

可使血管擴張

增加冠狀動脈血流

減少心肌受損



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

若發生心絞痛時，停止活動，坐下休息

依醫囑**舌下**含服

每5分鐘含服一顆，可連續含服三顆

若疼痛仍無法緩解，應立即通知醫生
或送至急診求治，勿自行開車



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

1. 隨時攜帶NTG，避免攜帶時靠近身體溫度太高的部位



www.bigstock.com · 16589189



2. 遵從醫師指示服藥控制及按時返院追蹤



3. 注意藥物應置於原容器內(暗色瓶子內避光)，將瓶蓋蓋緊
開瓶後可保存6個月



4. 當胸痛發作時，立刻置一藥片於舌下，最好坐下或平躺含服，防止低血壓

藥物
介紹

治療
疾病


藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

以**最低有效量**來緩解心絞痛之發作，切忌以大量至耐增加



不可咬碎，切記勿吞服

過量投與Nitroglycerin會引起嚴重頭痛，**不可**與Viagra併用

