





糖尿病藥物 病人衛教






第二型糖尿病

空腹血糖值 >126

糖化血色素>6.5





Sulfonylureas

糖立清

MEZIDE

利糖妥

MINIDIAB

克糖美錠

GlucoMET

美爾胰

Amaryl M


瑪爾胰


AMARYL

副作用

低血糖、發燒、喉嚨痛

嚴重腎功能障礙者





Meglitinides


諾和隆

NOVONORM

副作用

低血糖, 體重異常增加





Biguanides

利糖平

METFORMIN




副作用

有注射碘顯影劑的病人

老年患者不建議使用

嘔吐.噁心.腹瀉.乳酸中毒





Thiazodinedion

愛妥糖

ACTOS

愛妥蜜


ACTOSMET




副作用
水腫

禁忌

心衰竭第三級或第四級病人
腎功能不全者





α -Glucosidase Inhibitor

醣祿錠

GLUCOBAY




副作用

胃腸脹氣、腹鳴



**不可使用於嚴重腎功能不全的病患
不可使用於年齡小於18歲者**



DPP-4 inhibitor

佳糖維

JANUVIA

捷糖穩

JANUMET

高糖優美

GALVUS MET

昂格莎

ONGLYZA

康併莎

Kombiglyze XR


糖漸平

Trajenta

副作用

低血糖、鼻咽炎、上呼吸道感染、腹瀉、
噁心和頭痛、關節痛





SGLT-2 Inhibitors

福適佳

Forxiga

恩排糖


Jardiance



副作用

鼻咽炎、**尿路感染**、背痛、噁心





糖尿病注意事項

隨身攜帶含糖食物，一旦有低糖症狀，立即服用2塊方糖，如症狀未改善請立即就醫



飯後1~3小時是運動的最好時間，空腹時勿運動，運動時請不要赤腳

空腹時請勿喝酒，以免造成低血糖，請勿用酒吞服降血藥物，以免會有臉紅、心跳加快、嘔吐等不適現象

