

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Buwecon

薪保賜康

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



商品名：BUWECON
中文名：薪保賜康錠
劑量：Hyoscyamine
0.125MG

適應症



胃潰瘍、胃酸分泌過多、膀胱炎、妊娠嘔吐、腎痙痛、膽痙痛、痛經等
痙攣。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

胃、十二指腸潰瘍常併發
副交感神經機能亢進之症狀發生。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

薪保賜康錠乃莨菪生物鹼中之
主要抗膽鹼/抗痙攣劑，對胃
腸道、膽道、尿路等之鎮痙作
用，具顯著之效果。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



成人及 12 歲以上兒童：
一次 1~2 錠，每 4 小時或需要時一次，每日不超過 12 錠。



**以口服及舌下給藥均能
迅速而完全地被吸收!!!**



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

下列患者應謹慎用藥：



自主神經疾患者



甲狀腺機能
亢進



冠心病、鬱血性心
衰竭、心律不整、腎臟疾病患者
高血壓



使用抗膽鹼性藥物前應檢查患
者有否心跳過速現象

→ 避免藥物可能造成心跳加速



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

抗毒蕈素性藥物

- 帕金森氏症、抗憂鬱、抗精神分裂用藥

制酸劑

- 胃藥

某些抗組織胺

◆ 本藥應於餐前服用，而制酸劑則於飯後服用。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項


交互
作用

飲食
注意

吃太多.吃太快



愛喝酒



愛吃辛辣食物



愛吃油炸物