

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Fentanyl Patch



吩坦尼穿皮貼片劑



用藥指導

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

25 $\mu\text{g/h}$

"管制藥品局"

吩坦尼穿皮貼片劑 25微公克/小時


Fentanyl Transdermal Patch 25ug/h "NBCD"

每片含吩坦尼2.5毫克



管2

名稱：吩坦尼穿皮貼片劑
劑量：25 微公克/小時
治療：用於需要使用類鴉
片製劑控制的慢性疼痛和
頑固性疼痛。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

疼痛控制

疼痛是癌症病人常見症狀，從未使用過止痛藥的病人，應該從小劑量開始給予。



開始投藥時，必須一面評估效果並觀察副作用，一面調整藥量以減輕疼痛。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

鴉片類藥物的受體是以G-protein coupled receptor作為訊號傳遞。會造成止痛、鎮靜、便秘、欣快感、縮瞳、成癮、甚至**呼吸抑制**的作用。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

1. 選擇一處較無毛髮且完整的皮膚表面 (若有毛髮勿刮除，避免產生傷口)，一般會建議黏貼在胸、背、大腿或上手臂的皮膚上。



2. 選定黏貼處後，先用清水清潔即可，勿利用肥皂或任一刺激或改變膚質之物質，當皮膚完全乾燥後即可黏貼。

3. 取出貼片後，先移除背膜，將儲藥部份貼於皮膚後，請按壓約三十秒以確保貼片完全黏貼於皮膚上，且為了避免刺激，每次更換貼片時，請避免貼在同一部位。



4. 請整片使用，不要切割或剪開，以免破壞其緩釋劑型。



是否對
Fentanyl過敏

是否服用其
他藥物

勿拿藥給非
本人使用

告知醫師疾
病史

放置室溫.乾
燥處儲存

慎防兒童拿
取

請務必將貼上及撕下的時間日期填寫於紀錄表中，並予以簽名。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

單胺氧化
酶抑制劑

骨骼肌
鬆弛劑

CYP3A4
抑制劑

抗精神病藥

一氧化氮

鎮靜劑



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



禁飲含酒精飲料，此會加強本藥
的昏睡副作用。

