

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

肺結核 用藥



治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

結核病，是一種主要侵襲
兩肺的細菌性傳染病，是
由於結核桿菌侵入人體而
引起。



具有傳染性

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



商品名：Isoniazid

中文名：異菸鹼醯肼錠

劑 量：Isoniazid 300 mg

目前使用最廣泛的抗結核藥物



商品名：Priftin

中文名：無

劑 量：Rifapentine 150 mg

潛伏結核感染，無健保給付

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

3



商品名：Rifampicin

中文名：立汎黴素膠囊

劑 量：Rifampicin

150 mg /300 mg

易引起藥物不良反應,請多注意

4



商品名：Pyrazinamide

中文名：吡口并羧胺錠

劑 量：Pyrazinamide 500 mg

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



商品名：Ebutol

中文名：醫肺妥膜衣錠

劑 量：Ethambutol 400 mg

本品易潮解



商品名：Streptomycin

中文名：鏈黴素注射劑

劑 量：Streptomycin
1g/Vial

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



商品名：Mycobutin
中文名：淨核膠囊
劑 量：Rifabutin 150 mg
一天一次，兩餐間服用



商品名：Tubax
中文名：畢癆疾糖衣錠
劑 量：Prothionamide 250 mg
不可擅自停藥，以減少抗藥性

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



商品名：AKuriT-3
中文名：立剋核膜衣錠
劑 量：Rifampin 150mg,
Isoniazide 75mg, Ethambutol
275mg



商品名：AkuriT-4
中文名：立剋核-4 膜衣錠
劑 量：Rifampin 150mg,
Isoniazid 75mg, Pyrazinamide 400mg,
Ethambutol 275mg

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

速克伏 (3HP)
短程治療處方介紹

一週服藥一次，總共三個月



一次服藥：

900mg Isoniazid (INH) +
900mg Rifapentine (RPT)

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

服藥注意事項

(1) 不可中斷服藥，(2) 服藥後若發現視力
以免造成以下危險： 改變、聽力受損，請馬
上就醫。

a. 抗藥性產生

b. 疾病復發

c. 增加藥量

d. 傳染他人

(3) 服藥2至4週後即不
具傳染力。



治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Isoniazid **與** phenytoin

同時提
高濃度



Rifampicin

降低避孕藥、
coumadin類抗凝血劑、
口服糖尿病藥、副腎
皮質賀爾蒙、毛地黃
藥效

Ebutol不可與
制酸劑一起用。



治療
疾病

藥物
介紹


注意
事項

交互
作用

飲食
注意



食用油選用植物油



高鈣飲食

補充核果類



吃富含維他命C蔬果

治療
疾病

藥物
介紹

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

INH(Isoniazid)此藥會降低鈣和磷的吸收，因此飲食中需要**加強維生素B6、維生素D、鈣和磷攝取**及熱量和液體的攝取量，以對抗疾病的侵襲。

