編印單位: DON-4-牙 003 制定日期:105年06月03日

校閱日期: 113年03月01日第4版

## 牙周手術術後衛教指導



## ◆手術後注意事項

- 1. 放在手術區域粉紅色硬硬的材料的是牙周敷料,可以防止手術 區域受到外界刺激。敷料不可以拆除應等到複診時由醫師除 去,若在下次複診前若有剝落屑片但無任何不適,可不必理會。 若引起黏膜刺激或不舒服時,請與醫師聯絡。敷料在手術後數 小時會變硬,請在數小時內勿進熱食,以免阻礙敷料硬化。
- 2. 手術後唾液會有些微血絲,屬正常現象。若發生不要用力漱口 或吐血水,那會讓血流得更多;但是如果有持續性流血現象, 則請和醫師聯絡。手術當天不要用力漱口或吐口水,或用力大 聲講話,也不要用舌頭好奇去舔手術區域或敷料,因為這樣會 較易引起流血。若有流血不止情況,請緊咬紗布止血。
- 3. 手術後請維持刷牙習慣,請避免刷到手術部位。食物以軟性、 流質、溫涼食物為佳,不要熱食及刺激性食物 (如香煙、酒、 咖啡、濃茶等…)。
- 4. 如果醫師有開服藥處方,要按照指示服藥,不要任意停藥。手 術後,前三天輕微疼痛是正常現象,按醫囑服用止痛藥可減輕 疼痛,不痛可不吃,至於抗生素則必需按照指示服用完畢。
- 5. 術後前三天可冰敷於近手術區域之臉頰,以減低腫脹現象;冰 敷 15 分鐘後休息 10 分鐘再繼續,但不要冰敷過久以造成組織 傷害。術後第四天,如有腫脹,可用熱敷以增加血液循環而加 速恢復及消腫。熱敷以不燙皮膚為原則,可持續熱敷。日常生 活,原則上保持平常心,術後三,四天勿做激烈的運動或過度 講話。
- 6. 通常手術後,手術部位可能會有些**腫大或麻木**且持續數天,但 若腫大現象厲害,且伴隨劇烈疼痛請與醫師聯絡。
- 7. 手術區域的牙齒會暫時性地動搖與敏感,請不要擔心,這種情 形約三個月後,自然會恢復到術前狀況或更好。
- 8. 如敷料或縫線脫落,只要不痛,不出血,沒什麼關係。但須用 漱口水來保持手術區域之清潔。

| 總機: 08-7665995 | 救護專線: 08-7330290 | | 院址: 屏東市中山路123號 | 網址: www.paochien.com.tw

- 9. 術後約一至二星期,請務必回診拆線及檢查傷口。
- ※若有疑問請洽本院牙科:08-7665995轉分機2018