

- 藥物介紹
- 治療疾病
- 藥物作用
- 使用方式
- 併發症狀
- 生活須知
- 注意事項
- 交互作用
- 飲食注意

Blopress

用藥指導



| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 藥物介紹 | 治療疾病 | 藥物作用 | 使用方式 | 併發症狀 | 生活須知 | 注意事項 | 交互作用 | 飲食注意 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



Blopress


學名：Candesartan Cilexetil
中文名：博脈舒錠
劑量：8 mg
適應症：本態性高血壓

- 藥物介紹
- 治療疾病**
- 藥物作用
- 使用方式
- 併發症狀
- 生活須知
- 注意事項
- 交互作用
- 飲食注意

Blopress



- 降低動脈血壓
- 防止心臟衰竭



藥物介紹 ◀ 治療疾病 ◀ 藥物作用 ◀ 使用方式 ◀ 併發症狀 ◀ 生活須知 ◀ 注意事項 ◀ 交互作用 ◀ 飲食注意

本品為一種血管收縮素拮抗劑 (Angiotensin II Receptor Antagonist) 為降壓藥的一種。能使血管平滑肌收縮降低，使血管擴張，而達到降血壓的目的。



藥物介紹 → 治療疾病 → 藥物作用 → **使用方式** → 併發症狀 → 生活須知 → 注意事項 → 交互作用 → 飲食注意

一 二 三 四 五 六 日



▲ 固定時間服藥！



- ★ 空腹或與食物一起服用
- ★ 勿自行停藥或加藥
- ★ 一天服用一次，
同一時間給藥。


| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 藥物介紹 | 治療疾病 | 藥物作用 | 使用方式 | 併發症狀 | 生活須知 | 注意事項 | 交互作用 | 飲食注意 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

三高族
高血壓篇3

高血壓的併發症

健談
havemary.com
圖文創作：健談

腦中風
腦內出血




血管硬化




全身性動脈硬化



腎動脈硬化、腎
功能病變與衰退



心肌肥厚，心臟
衰竭、擴大



健談 havemary.com

更多資訊請上 健談 havemary.com

- 藥物介紹
- 治療疾病
- 藥物作用
- 使用方式
- 併發症狀
- 生活須知**
- 注意事項
- 交互作用
- 飲食注意

三高族 高血壓篇10

高血壓的日常保健

健談 havemary.com 圖文創作：健談

規律運動、作息正常、放鬆心情

洗澡時避免水溫過高或過低，36-40度最適合

溫水

戒菸、戒酒

多吃蔬果、養成定時排便習慣，預防便秘

冬天起床時，應先添加衣服，並稍做暖身

家中自備血壓計，每天量一次或不舒服時量，並記錄下來

更多資訊請上 健談 havemary.com



| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 藥物介紹 | 治療疾病 | 藥物作用 | 使用方式 | 併發症狀 | 生活須知 | 注意事項 | 交互作用 | 飲食注意 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

三高族
高血壓篇8

高血壓的危險族群

健談
havemary.com
圖文創作：健談

酗酒、抽菸

不常運動

壓力大

膽固醇過高

肥胖

飲食高鹽、過油

家族遺傳

健談 havemary.com

更多資訊請上 健談 havemary.com



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式


併發
症狀

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



Heparin
肝素



NSAIDs

鋰鹽

藥物介紹 ▶ 治療疾病 ▶ 藥物作用 ▶ 使用方式 ▶ 併發症狀 ▶ 生活須知 ▶ 注意事項 ▶ 交互作用 ▶ 飲食注意

食物怎麼吃？



維持固定飲食

飲食習慣固定即可，不須過度緊張
若有改變請告知醫師或藥師

注意特定食物

某些食物或保健食品食用份量需特別注意，
增量或減量時一定要告知醫師