

藥物介紹 治療疾病 藥物作用 使用方式 禁忌症狀 生活須知 注意事項 交互作用 飲食注意



Bokey

用藥指導



藥物介紹 ▶ 治療疾病 ▶ 藥物作用 ▶ 使用方式 ▶ 禁忌症狀 ▶ 生活須知 ▶ 注意事項 ▶ 交互作用 ▶ 飲食注意



Bokey

中文名：伯基腸溶微粒膠囊

學名：Acetylsalicylic acid

劑量：100 mg


適應症：心肌梗塞、血管栓塞

注意：本品可能引起出血之不良反應，應小心用藥與觀察。


藥物介紹 ▶ 治療疾病 ▶ 藥物作用 ▶ 使用方式 ▶ 禁忌症狀 ▶ 生活須知 ▶ 注意事項 ▶ 交互作用 ▶ 飲食注意

Bokey

- 阻止血液凝結
- 防止血栓形成或擴大



藥物介紹 治療疾病 藥物作用 使用方式 禁忌症狀 生活須知 注意事項 交互作用 飲食注意



- ①本藥可有效抑制循環內血小板
Thromboxane之生成，進而緩解血管之痙縮
及防止血小板之凝集。
- ②本藥之抗血小板凝集效應，可延緩或降
低血栓性栓塞疾病之發生及惡化。

藥物介紹 → 治療疾病 → 藥物作用 → **使用方式** → 禁忌症狀 → 生活須知 → 注意事項 → 交互作用 → 飲食注意

一 二 三 四 五 六 日



▲ 固定時間服藥！



- ★ 固定時間，隨餐整粒吞服。
- ★ 可將膠囊打開，直接吞服。
- ★ 忘記吃藥的措施：
 1. 當天想起立即補吃
 2.  下次服藥食物吃兩倍量

藥物介紹 → 治療疾病 → 藥物作用 → 使用方式 → **禁忌症狀** → 生活須知 → 注意事項 → 交互作用 → 飲食注意

▲ 下列症狀不可使用

嚴重肝、腎疾患、血友病或其他出血性疾患。

對本藥曾有過敏病史的患者。



藥物介紹 ▶ 治療疾病 ▶ 藥物作用 ▶ 使用方式 ▶ 禁忌症狀 ▶ **生活須知** ▶ 注意事項 ▶ 交互作用 ▶ 飲食注意

均衡飲食

避免大量飲酒

進行侵入性手術須告知用藥

曾對此藥過敏者禁用



藥物介紹 治療疾病 藥物作用 使用方式 監測濃度 生活須知 注意事項 交互作用 飲食注意

以下情形發生...


立即就醫



異常出血！



不明瘀青



血便黑便



牙齦出血



經期過長

藥物介紹 → 治療疾病 → 藥物作用 → 使用方式 → 監測濃度 → 生活須知 → 注意事項 → **交互作用** → 飲食注意


抗凝血劑

NSAIDs

類固醇

ACE
inhibitors

酒精



藥物介紹 治療疾病 藥物作用 使用方式 監測濃度 生活須知 注意事項 交互作用 飲食注意

飲食預防心血管疾病

