

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



Cimetidine

胃潰佳膜衣錠 200mg

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

商品名：Cimetidine (Bigacon)

中文名：胃潰佳膜衣錠

劑 量：200mg/Tab

適應症：胃潰瘍，胃食道逆流



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用


飲食
注意

消化性潰瘍是現代人常見的消化道疾病，
目前認為主要致病原因包括：

胃酸過度分泌

止痛藥
(NSAIDs)

幽門螺旋桿菌
感染



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

★治療對胃食道逆流相關疾病，常用制酸劑來治療

Cimetidine為制酸劑之一，是H₂受體阻斷劑，因為組織胺是最強之胃酸分泌劑，所以它可有效地抑制胃酸之分泌，達到降低胃酸分泌的效果。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

★★★用法：

●胃潰瘍、十二指腸潰瘍：

成人一日投與**800mg**，早餐後及睡前各服用兩錠（**400mg**），或於睡前一次服用四錠（**800mg**）。

●胃酸分泌過多病患：

劑量依病患所需而定，只要仍有徵兆存在，則需持續使用，但每日劑量誤超過**2.4gm**。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

避免刺激性
食物

進食要
細嚼慢咽

忌酸辣

宜清淡

生活規律
不可太疲勞

食物必須加熱
煮沸才食用



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

發生過敏或不適現象，立即停藥

偶有頭痛、腹痛、噁心嘔吐、皮疹、眩暈

孕婦、授乳者請先諮詢醫師

遵醫囑使用不可自行停藥

長期服用，可能有男性乳房增 殖之現象



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

經由細胞色素 P450 系統代謝的藥物

心臟用藥

Propranolol

茶鹼

Theophylline

局麻止癢

Lidocaine

抗凝血劑

warfarin

止痛藥

Ibuprofen

抗癲癇

Phenytoin

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

☞ 平日健脾胃，遠離胃潰瘍

護胃好食物一覽表



維

生素A 胡蘿蔔、地瓜葉、菠菜

保護胃腸黏膜，對於促進傷口癒合效果良好。



維

生素C 芭樂、奇異果、甘藍菜、地瓜葉

增強胃的抗病能力，有效保護胃部功能。



維

生素K 花椰菜、秋葵、木耳

修護損傷組織，緩解胃酸逆流對食道造成的傷害。



黏

液蛋白 秋葵、山藥、南瓜、地瓜

富含多醣體，對腸胃有保護作用，可幫助修復胃黏膜、抵抗胃酸。