

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Emetrol

用藥指導



大眾養生網
www.dazhuang.com

YX養生網

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



Emetrol

中文名：癒吐寧錠

劑 量：Domperidone 10mg

適應症：噁心、嘔吐、胃腸脹氣。

注 意：可能有頭痛、口乾、焦慮等不良反應。

藥物
介紹

治療
疾病


藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



防止肚子痛以及用於治療帕
金森氏症的藥物引起的嘔吐。

用於治療胃排空不良。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

1. 加速餐後的胃排空，因其可增進胃門括約肌的緊張力，並促進幽門括約肌於餐後的蠕動擴張程度。
2. Domperidone為一多巴胺拮抗劑，可阻斷D1及D2接受體，作用於周邊及後腦血障壁外之化學體接受體刺激區(CTZ)，故具促進胃腸道平滑肌活動及止吐之作用。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

★請依照醫師指示服用此藥。

★餐前 15-30 分鐘及睡前服用此藥。

★忘記吃藥怎麼辦？

- 想起來立即服用。
- 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
- 切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項


交互
作用

飲食
注意

★此藥可能增加異常心跳的機率。

高風險族群：

1. 每天使用超過 30 毫克劑量的患者
2. 60 歲以上的老年患者
3. 容易患上特定類型的心律異常疾病的患者



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

抗膽鹼藥物



- 可能會降低domperidone之抗消化不良作用

胃藥

- 可能會降低domperidone之口服生體可用率

ketoconazole

- 會明顯抑制domperidone的代謝，使血中濃度上升

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

- 1.暫時避開產氣食物，例如豆類、洋蔥、麥片、鬆餅等。
- 2.少吃高脂肪、油炸食物，因會延遲胃排空。
- 3.避免嚼食口香糖。
- 4.細嚼慢嚥慢慢吃，少喝會釋放二氧化碳的汽水可樂和啤酒。
- 5.吃飽後不要馬上躺下。

