

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Paramol (Acetaminophen)

普除痛錠

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



商品：Paramol 普除痛
成分：Acetaminophen 500 mg
適應症：解熱、鎮痛



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

疼痛控制

疼痛是許多病人常見症狀，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量，且注意是否有潛在疾病。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

能夠**提昇疼痛的閾值**，並能減少從下視丘之體溫控制中樞傳出的交感神經衝動，還具有輕微的抗利尿作用，**止痛和解熱**的效應約與Aspirin相當。



藥物
介紹

治療
疾病


藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，每次1~2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

告知醫師是否對本藥物過敏




告知醫師是否有服用其他藥物



年幼的小孩不要使用本品

肝病、腎臟病、慢性酒精中毒
以及老年人服用本品宜小心

每日最高劑量為4g



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

藥物

Barbiturates

Mephenytoin

- 增加 Acetaminophen 的代謝，而降低其療效，可能增加其肝毒性。



長期酗酒

- 增加本品肝毒性的危險。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



+

