

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

Primperan (Metoclopramide HCl)

腹寧朗膜衣錠

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用



商品名：**Primperan**
中文名：腹寧朗膜衣錠
成分：**Metoclopramide HCl**
5 mg/Tab



適應症

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

抑制胃部肌肉鬆弛，加強副交感神經對胃部肌肉收縮之刺激作用，達到加速胃內食物排空至腸道中。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

可刺激上消化道的運動，**加速胃部及十二指腸排空**，並**抑制嘔吐中樞**，減緩嘔吐症狀。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用



通常成人：一日**10-30mg(2~6錠)**，分**2-3**次於飯前服用，但可依年齡、症狀適宜增減之。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

嗜睡、眩暈之不良反應

- 服用本藥後應避免從事開車等伴有危險性的機械操作。

錐體外徑症狀

- 罕見，易發生於小兒與老人，如出現手指振顫、肌肉僵硬、頸和臉部攣縮、眼球回轉、焦躁感等症狀請告知醫生。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

多巴胺致效劑

- 拮抗藥效

多巴胺拮抗劑

(如抗思覺失調症藥物)

- 注意是否有錐體外症狀的副作用