

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用


定期
追蹤

Sevikar 5/20 Tablet

Amlodipine besylate 5mg,
Olmesartan medoxomil 20mg

舒脈康膜衣錠5/20毫克

用藥須知



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤



藥物：Sevikar 5/20 Tablet

舒脈康膜衣錠5/20毫克

**成分：Amlodipine besylate 5mg,
Olmesartan medoxomil 20mg**


適應症：治療高血壓。



高血壓

⊕ 高血壓分類表

分 類	收縮壓 (毫米汞柱 mmHg)	舒張壓 (毫米汞柱 mmHg)
正常血壓	<120	和 <80
高血壓前期 (警示期)	120~139	或 80~89
第一期高血壓	140~159	或 90~99
第二期高血壓	≥ 160	或 ≥ 100



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤

Sevikar®是兩種降血壓藥物的複方：一種是鈣離子拮抗劑或慢速通道阻斷劑 amlodipine besylate，及一種是血管收縮素II受體阻斷劑 olmesartan medoxomil。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善

交互
作用

定期
追蹤

感覺

- 即使您感覺良好，不可自行停藥。

時間

- 每日相同時間服用此藥
- 勿忘記定時吃藥。



食物

- 是否與食物同服均可



飲料

- 多喝不含咖啡因的飲料，除非醫師告訴您少喝飲料。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤

使用此藥必須注意哪些事項？

應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。

請經常檢查血壓。

若過度排汗、體液流失、嘔吐或稀便，請告知醫師。可能有低血壓風險。

飲酒前，先洽詢醫師指示。

若正接受低鹽或無鹽餐，請告知醫師。

若正在使用含鉀的鹽替代品、保鉀利尿劑或鉀補充劑，請洽詢醫師。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用


定期
追蹤

amlodipine並不會影響藥物與人體血漿蛋白的結合。

Olmesartan medoxomil
不影響P450酵素。

禁忌

- 於糖尿病患或腎功能不全患者 ($GFR < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$) 禁止合併使用本品及含 aliskiren 成分藥品。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤

請經常檢
查血壓



記錄血壓值

不可擅自停藥