

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

Ginkgocentrane

杏銀膜衣錠

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用



商品：Ginkgoconcentrate
(杏銀膜衣錠)

成分：Ginkgo Extract
適應症：末梢血行障礙
(預防腦血管或週邊血管
疾病)



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

何謂末梢血循障礙？

①

什麼是「末梢血管」？



綿密微細小血管，就是末梢血管

身體器官需要藉由血管維持血流暢通，才能正常運作，血管深入人體每個器官及組織，血液提供足夠的血液及養分，以維持人體器官正常運作。



②

什麼是「循環障礙」？

正常的血管是枝數多、不變形且流速通暢。一旦血流因為**游離性血脂肪**或是**分解不良蛋白質等物質阻塞**，造成**局部供氧不足**，就會發生末梢血管不暢通，在阻塞的地方對應器官，出現各種**機能上的障礙**，甚至組織壞死。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

銀杏配糖體可以有效增進大腦的血流量提昇氧氣供應防止缺氧性腦細胞受損。

銀杏同時可以拮抗血小板凝集因子(PAF)防止腦血栓保護腦血管，因此具有腦神經之防護效果。

世界衛生組織(WHO)也已認定銀杏確實能改善下列疾病：

- A.生理及心智機能老化
- B.腦部缺氧
- C.智力降低
- D.老化痴呆
- E.艾滋海默症



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

服用此藥改善**效果是漸進**的，不會有立即功效。



初次服用可能會產生輕微胃腸不適、頭痛與皮膚過敏等症狀。

劑量應由醫師作調整請遵照指示用藥，未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

- ①假如距離服藥時間剛過不久，請在想起時立即服用。
- ②如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次，下次的用藥時間在服用。
- ③切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用



孕婦與幼兒應在醫師的指示下再服用。心臟衰竭患者禁止服用本製品。

合併使用阿斯匹靈或非類固醇抗發炎止痛劑和抗凝血劑，開刀手術前請勿使用銀杏製劑，可能會增加出血的危險。



初次服用可能會產生輕微胃腸不適、頭痛與皮膚過敏等症狀。



過量服用會導致暈眩與低血壓，嚴重時可能會造成癲癇症惡化。

告知醫師是否對本藥物過敏，以及是否有服用其他藥



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

銀杏會使抗凝血劑強化抗凝血效果。
開刀手術前要避免使用。
例:Warfarin



銀杏可能會提高癲癇的發作機率，
請勿與抗癲癇藥物合併使用。

