

治療 藥物 使用 注意 交互 飲食
疾病 作用 方式 事項 作用 注意

Herbesser





藥物介紹。

治療 疾病

藥物 作用

使用方式

注意┃ 事項▶ 父与 **●** 作用 **▶**

注意







商品:Herbesser 合必爽錠

成分:Diltiazem

適應症:狹心症、高血壓





藥物 介紹

治療

藥物

使用

注意

交互

飲食

病▶作用▶方式▶▮

事項

作用📙
















症狀發作時, 通常發生在 胸骨下方, 或整個胸部, 出現絞痛。

誘發的原因主要是運動,用力,情緒激

動或天冷。



狭心症其實是心絞痛 的俗稱,還可分成穩 定型與不穩定型,不 穩定型即使在休息時 ,也可能發生





治療

藥物

使用

注意

火旦作用

飲食

介紹

PE

派心症的分



第一級

只有在費力大 速度快,時間 長的活動時才 會發生。







第二級

無法太激烈的日常活動,飯後情緒激動時症狀發生更明顯。





治療

藥物

方式事項

注意

飲食







第四級 平常休息時也可能發作。





藥物 介紹_I 治療疾病

藥物 作用

使用方式

注意┃

交互 作用

飲食注意

Mosquito

Diltiazem屬於它是 一種鈣離子阻斷劑, 這類藥物會抑制細胞 外鈣離子經由特異的 「緩慢鈣離子管道」 進入心肌和平滑肌的 細胞裡。



抗狹心症的效應 包括**擴張冠狀動 脈和小動脈**和阻 止冠狀動脈痙攣。



同時也會擴張末梢小脈,降低總阻力,這 些阻力是心臟必須做 功來克服的,因此相 對的會減少心肌能量 的消耗和氧 的需求量。



治療 疾病人作用人方式人事項人作用

藥物

使用 注意

交互

累

飲食

服用此藥時,應吞服整 顆的藥物,不可在嘴內 咀嚼或壓碎服用

> 存放於室溫下,避光,並且 存放在乾燥處。

請遵照指示用藥,未經醫師指 示不可自行調整劑量或增加服 藥次數。





治療 疾病

藥物

使用 作用,方式,事項人

注意

交互 作用

注意

飲食

如果我忘記(錯過) ,該怎麼辦?

- ①假如距離服藥時間剛過 不久,請在想起時立即服 用。
- ②如已接近下一次用藥時 間,則跳過錯過的那次, 下次的用藥時間在服用。
- ③切勿一次服用兩倍或額 外劑量。





疾病人作用人方式、事項人作用

藥物

使用

注意

第二度以上房室傳導阻斷、竇房傳 導阻斷之患者不可服用,請在用藥 前告知醫師。

孕婦或以及受乳婦人不可服用,因 本藥有致腦畸形及胎死作用,請在 用藥前告知醫師。

偶有GOT, GPT增高, 黃疸 肝腫大。如出現這些症狀 要立即停藥。



若您出現過敏反應等副作用,如 蕁麻疹、發癢、皮膚發紅、腫脹、 起泡或脫皮,而且有可能伴隨發 燒時,請尋求醫療協助。

告知醫師是否對本藥物過敏, 以及 是否有服用其他藥



治療 疾病人作用人方式人事項人


藥物

注意

作用

飲食

會對AV節傳導延長有加成作



本藥會讓其他藥物的血中濃度 上升。 例如:



Quinidine





藥物 介紹

治療疾病

藥物 4

方式

生活▮3

心絞痛患者的飲食注意

酒精

MOCHHADY HILLDRY PKITADY

長期酗酒是冠心病的發病誘因,飲酒 後酒中乙醇等成分進入血液,可使心 跳加快、血壓升高、冠脈痙攣、心 肌耗氧量增加,誘發心絞痛發作。 所以心絞痛患者絕對禁止飲酒。

酒精辛辣刺激食物

發作因為辣椒、生薑、大蔥、大蒜、椒等辛辣食物,性味辛溫燥烈,食用後經吸收進入血液,可使心跳加快,加重心肌缺血缺氧,誘發心絞痛。



治療

藥物 作用↓

使用

方式▍改善▍

飲食

濃茶和濃咖啡



濃茶和濃咖啡中所含的大量茶鹼和咖啡 因可興奮中樞神經、心血管,從而引起 心跳加快、心律失常,使心肌 耗氧量增加,易引起心絞痛。

雞湯

雞湯中的雞油,屬過飽和脂肪酸,極易 溶於水,喝了雞湯能增加動脈脂肪 從而增加冠狀動脈的硬化程度

高糖飲食

血糖的升高與冠心病有密切關係。因高糖 飲食可使體內三醯甘油的合成增加,引起 血脂升高。此外血糖升高可使血液呈高凝 滯態,血液流動減慢,引起心肌缺血缺 。所以冠心病患者應忌高糖飲食。