

寶建藥品快訊

代碼	新進藥品	說明
OMIR5	Mirapex® P.R. 1.5 mg/Tab (Pramipexole)	1090919 藥委會新進藥品
OSET	Setron® 1 mg/Tab (Granisetron)	1090919 藥委會新進藥品
IERT	Ertacure 1 g/Vial (Ertapenem)	1090919 藥委會新進藥品 併存：Invanz 1 g/Vial (代碼：IINV)
OFLUA	Acetin Effervescent Tablets 600mg (Acetylcysteine)	健保碼異動

【內文共 4 頁】

【新藥通知】

1、Mirapex P.R. 1.5 mg/Tab (樂伯克持續性藥效錠)

主 成 分：Pramipexole (ATC Code: N04BC05)

類 別：Nonergot-derivative Dopamine Receptor Agonists 28:36.20.08

適 應 症：治療帕金森氏症的徵候及症狀。

用法用量：**Parkinson disease:**

— Initial: 0.375 mg once daily; dosages may be increase gradually, not more frequently than every 5 to 7 days to 0.75 mg once daily and then (if necessary) by 0.75 mg per dose;
Maximum: 4.5 mg once daily.

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

不良反應：頭痛、靜坐不能、便秘、噁心、無力、頭昏眼花、椎體束外運動、失眠、嗜睡或幻覺等情形。

注意事項：1、整粒服用，不可剝半、磨粉或咀嚼。

2、不可突然減量或停藥。服本藥治療期間不可飲酒。

3、若出現噁心症狀，可與食物一起服用，可能有助減少噁心的症狀。

4、腎功能不良者請先告知醫師。

5、由坐或臥姿起身時請徐緩，以避免姿勢性低血壓發生

6、本藥可能會引起頭昏或嗜睡，避免開車或進行需警覺性及協調能力之活動。

用藥分級：本品依 FDA 孕婦用藥分級列為 **C** 級。

進用原由：109/09/19藥事管理委員會議決同意進用。

藥品外觀：白色，長圓柱形錠；錠劑一面有P3字樣，另一面有圖樣標記。(大小:7 X 5 mm)

處方名：**1.5mg Mirapex P.R. Tab (Pramipexole)**

電腦代碼：**OMIR5**

健保代碼：BC25260100

健保單價：49.3 元/粒


品項代碼 (料號)：**100B025260**

健保規定：帕金森氏症治療藥品：1、如病人開始出現功能障礙，在使用 levodopa 之前或同時，得使用一種 dopamine agonist (ropinirole、pramipexole、pergolide、lisuride 及 rotigotine)，或 amantadine，或是 levodopa 併用 COMT 抑制劑 (entacapone：如 Comtan film-coated tab.) 2、若已同時使用上述藥物且達



高劑量，仍無法達到滿意的 "on" state，或出現運動併發症（如異動症或肌強直），需合併使用多類藥物治療時，應於病歷上詳細記載理由。
 3、Pramipexole 及 ropinirole 用於治療原發性腿部躁動症時需先排除腎衰竭、鐵缺乏症及多發性神經病變，且不得與 dopamine agonist 及 levodopa 併用。
 (1) pramipexole 每日最大劑量為 0.75mg。

相似藥品：



2、Setron® 1 mg/Tab (賜安特膜衣錠)

【南光】

主 成 分：Granisetron HCl (ATC Code: A04AA02)

類 別：5-HT₃ Receptor Antagonists 56:22.20

適 應 症：預防及治療抗腫瘤化學療法與抗腫瘤放射線療法引起的噁心、嘔吐。

藥性簡述：Selective 5-HT₃-receptor antagonist, blocking serotonin, both peripherally on vagal nerve terminals and centrally in the chemoreceptor trigger zone

用法用量：**Prevention of chemotherapy-associated nausea and vomiting:**

Oral: 2 mg once daily up to 1 hour before chemotherapy or 1 mg twice daily; the first 1 mg dose should be given up to 1 hour before chemotherapy (with the second 1 mg dose 12 hours later). Administer only on the day(s) chemotherapy is given

Prophylaxis of radiation therapy-associated emesis:

Oral: 2 mg once daily within 1 hour of radiation therapy. Duration 7 day.
Safety and efficacy not established in children <18 yr.

不良反應：頭痛、便秘。

注意事項：Granisetron HCl 可能會降低腸的蠕動性，故有亞急性腸阻塞症狀之病患，於使用 Granisetron HCl 後需嚴密監測。

用藥分級：本品依 FDA 孕婦用藥分級列為 B 級。

進用原由：109/09/19 藥事管理委員會議決同意進用。

藥品外觀：白色，三角形錠劑；錠劑一面有 NK 字樣，另一面有 504 字樣。
 (大小:18.8 mm x 10 mm)

處 方 名：**Setron Tab 1mg(Granisetron)**

電腦代碼：**OSET**

健保代碼：AC55953100

健保單價：178 元/粒

品項代碼 (料號)：**100A055953**

健保規定：1、血液幹細胞移植患者接受高劑量化學治療時。2、惡性腫瘤患者及風濕免疫疾病（如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、貝西氏症、皮肌炎/多發性肌炎、硬皮症、血管炎等）患者接受化學治療時，依下述情形使用：(1) 前述患者處方高致吐性藥品，可預防性使用 ondansetron 8~32 mg、granisetron 1~3 mg、tropisetron 5 mg、ramosetron 0.3 mg 一日劑量。必要時其使用以不得超過五日為原則。若發生嚴重延遲性嘔吐，得直接使用，每療程使用不得超過五日為原



則。(2)前述患者處方中致吐性藥品，可預防性使用 ondansetron 8~32 mg、granisetron 1~3 mg、tropisetron 5 mg、ramosetron 0.3 mg 一日劑量。若發生嚴重延遲性嘔吐，使用 dexamethasone 及 metoclopramide 無效之病例，每療程使用以不得超過五日為原則。病歷需有使用 dexamethasone 及 metoclopramide 無效之記錄。(3)血液腫瘤病患接受化學治療，需使用中、高致吐性抗癌藥品時，得依患者接受抗癌藥品實際使用天數使用本類製劑。(4)Palonosetron 限於中、高致吐化學治療之前使用。3、接受腹部放射照射之癌症病人，得依下列規範使用 ondansetron、granisetron 等藥品：(1)Total body or half body Irradiation (2)Pelvis or upper abdominal region of single irradiation dose > 6 Gy (3)腹部放射治療中產生嘔吐，經使用 dexamethasone、metoclopramide 或 prochlorperazine 等傳統止吐劑無效，仍發生嚴重嘔吐之患者。

【併存通知】

1、Ertacure 1 g/Vial (厄他可注射劑)

主成分：Ertapenem Sodium

處方名：**Ertacure Inj 1g(Ertapenem)**

電腦代碼：**IERT**

健保代碼：AC59078209

健保單價：564 元/瓶

品項代碼(料號)：**1I0A059078**

原由：109/09/19 藥事管理委員會議決與
MSD 製品 Invanz 1 g/Vial 併存。

藥品外觀：注射劑

【信東】



【換廠通知】

1、Acetin Effervescent Tablets 600mg (愛克痰發泡錠)

【健喬信元】

主成分：Acetylcysteine 600mg

處方名：**發泡錠 Acetin Effervescent Tab 600mg (Acetylcysteine)**

電腦代碼：**OFLUA**

健保代碼：AB45993100 健保單價：5.6 元/粒 品項代碼(料號)：**100A043656**

異動原由：1、廠商異動健保碼

2、截至 109/12/16 08:00 止，舊品 HIS 關檔停用。

備註：1、新、原外觀比較參見下表。

新品項	原品項
Acetin Effervescent Tablets 600mg % 院用處方名： 發泡錠 Acetin Effervescent Tab 600mg (Acetylcysteine)	Nsteine Effervescent Tablets 600mg 院用處方名： 錠劑 Nsteine Effervescent Tab 600mg (Acetylcysteine)
廠牌：健喬信元	廠牌：健喬信元
批價代碼： OFLUA	批價代碼： OFLUN

