



小兒退燒藥使用須知

➤ 本院小兒常用退燒藥物：

一、商品名：安佳熱糖漿

處方名：Acetaminophen Syrup

主成分：Acetaminophen 24mg/ml

二、商品名：依普芬口服懸液

處方名：Ibuprofen Oral Suspension

主成分：Ibuprofen 20mg/ml

三、商品名：非炎栓劑

處方名：Voltron Suppository

主成分：Diclofenac 12.5mg

➤ 該如何使用退燒藥？

1. 依照醫師指示使用藥品。千萬不可以自行增加服用次數或將藥量增加，因為使用過量可能會產生退燒藥的不良反應。
2. 一般而言，當肛溫到達 38.5°C ，腋溫或耳溫到達 38°C 時，才需要服用口服退燒藥，退燒藥每次服用間隔一定要相隔4~6小時。原則上，服藥後約1小時才會發揮退燒作用。
3. 若醫師指示使用二種不同的口服退燒藥，則在必要時可交替使用，但不可同時使用，兩藥給藥間隔需相隔4小時。
4. 如果服用口服退燒藥1~2小時後仍然沒有退燒，且體溫持續上升超過 39°C ，可使用肛門栓劑（務必將栓劑外包裝除去後才使用）。

➤ 使用退燒藥物要注意什麼？

1. 退燒藥只能用於暫時緩解發燒的症狀，對於造成發燒的潛在疾病並沒有治療的效果，因此必要時才可以服用，且不可以長期服用。

2. 使用肛門栓劑一天不可以超過三次，否則容易因肛門內腸黏膜被過度刺激造成腹瀉。如有腹瀉的症狀，請勿使用肛門栓劑。
3. 有熱痙攣體質者，如果發燒請先使用退燒藥，並立刻就醫。
4. 除非醫師指示，否則不同的退燒藥不可以隨意併用。
5. 服用解熱糖漿或懸浮液前，請先振搖均勻後再服用。
6. 除使用退燒藥外，可藉由以下方式輔助降低體溫：全身溫水拭浴或洗熱水澡，冰枕、低溫毯或貼於皮膚表面的散熱貼片，多喝水。

➤ 可能出現哪些副作用？

1. 服用退燒藥後，如果有出現眼睛或皮膚變黃、糞便顏色變黑或變紅、尿量減少或是下背痛，請立即回診告知醫師。
2. 發疹、搔癢、噁心、嘔吐、腹痛、食慾不振、頭暈、耳鳴，以上的症狀不一定會發生，如果出現且持續一段時間請告知醫師。

➤ 藥品應如何儲藏？

1. 儲存於室溫下（懸浮液劑請勿冷凍），避免陽光直接照射。
2. 存放於兒童拿不到的地方，以免孩童誤服。

用藥諮詢電話：08-7665995（分機）1351

此衛教單張未包含所有的藥品資訊，若您有其他相關問題，請諮詢您的醫師或藥師！